

يعتبر تحديد الجنس في الحمام وتميز الذكر عن الأنثى في سن مبكرة من الشروط المهمة لنجاح مشروع التربية. وكمواصفات عامة فإن الذكر يكون عادة أكبر من الأنثى ولوه رأس أكبر وعنق أغلظ، كما أن الذكر أكثر ميلاً للاعتداء والهجوم ويتميز ريش عنق الذكر ببريقه وجمال ألوانه.

السلوك المميز للذكر هو ميله الدائم لإصدار الهديل (صوت الحمام) والت卜ختر في مشيته، وكثيراً ما يهاجم الحمام الآخر بقوة مصدرها هديلاً حماسياً، والأكثر من ذلك أنه يلجأ لنفع جسمه بالهواء ليمشي مغروراً منفوخاً مع بسط ذيله ونشره، ويترافق حول الأنثى مع حركة مسح الأرض بذيله..

وأثناء إقامة العش يكون الذكر هو المسئول عن نقل القش والأغصان الرفيعة إلى المكان المختار.

والواقع أن الطرق السابقة كلها تعتمد في المقام الأول على فراسة المربى وقوته ملاحظته، وتوجد الآن طرق علمية تعطي نتائج مؤكدة يمكن عن طريقها تمييز الذكر عن الأنثى في سن مبكرة، ويكون ذلك بالاستعانة بأجهزة علمية بسيطة تذكر منها: المنظار الطبي حيث يعمل على إحداث توسيع لفتحة المجمع حتى يتسعى للمربى فحص الفتحات التناسلية الواقعة داخل المجمع.



# أهمية تحديد جنس الحمام في سن مبكرة



## الاستعانت بالمنظار الطبي

### فى الكشف عن جنس الحمام يسرت هذا الأمر على المربين، فضلاً عن إلماهم بتفاصيل أخرى خاصة بالعمليات التناسلية للطائر

البيض أو الأنثى التي تمر بمرحلة الراحة يكون منفذ البيض ذا قطر حوالي نصف سـم. والكشف عن نوع الحمام بالطريقة السابقة لا يشكل أى خطورة ولكن يجب فقط انتياد اكتساب الخبرة الكافية للامسة الحمام بغيررض الكشف المبكر عن احتمال وضع البيض فى فترة قريبة والتي يتحمل تواجدها فى مبيض الحمامـة وهذه الطريقة ناجحة بنسبة ١٠٠٪، كما يمكن عن طريقها تحديد جنس الحمام بسرعة وكفاءة.

بالضغط الخفيف بالطرف النهائى للمنظار الطبـى على قاعدة الخصيتين؛ حيث تشاهد بعدها خروج نقطة من المنى شديدة البياض، وعادة يبدأ النضج الجنسـى للذكور بدءاً من الشهر الرابع. وفي الإناث يمكن مشاهدة نهاية قناة البيض بجوار فتحة الشرج بنحو ٢ سم، وعند فحص المبيض فى الأيام التالية لوضع المبيض نلاحظ أن قطره يتتجاوز فى هذه الحالة ١ - ١,٥ سم، كما أنه يزداد فى الطول.. أما فى حالة الأنثى التي لم يسبق لها وضع

وفي الذكر وبالاستعانت بالمنظار الطبـى يمكن رؤية الطرفين النهائين للقناة المونية ويبلغ طول الواحدة منها نحو ٢ ملم وذات قطر صغير جداً، ويقع هذان الطرفان النهائيان على بعد ١ سم من فتحة الشرج على جانبي محور العمود الفقرى ويتباعدان عن بعضهما بـنحو ١,٥ سم، ويمكن ملاحظة الطرفين النهائين فى وقت مبكر عندما يبلغ سن الذكر حوالي ٣ شهور. والواقع أنه فى هذه السن لا يكون ذكر الحمام قد بلغ سن النضج الجنسـى، ويمكن التحقق من ذكورة الطير