

برنامج الخدمات البيطرية

بقايا الأدوية البيطرية

أ.د. مصطفى فايز

كلية الطب البيطري - جامعة قناة السويس

• فترة سحب الدواء فى أهم الأدوية المستعملة فى الدواجن:

فترة السحب	أهم مضادات الكوكسيديا	فترة السحب	أهم المضادات الحيوية ومضادات البكتريا
٢ أيام	الأمبيروليم	٥ أيام	اللينكوسبكتين
٢ أيام	الموننسين	٣ أيام	اللينكوميسين
٥ أيام	الرونيديدين	٥ أيام	الأسبكتينومايسين
٥ أيام	اللاسالوسيد	٧ أيام	الأوكسى تتراسيكلين
٥ أيام	الهالوفيجينون	٧ أيام	الكلورتتراسيكلين
٥ أيام	الناراسين	٧ أيام	التتراسيكلين
٥ أيام	السالينومييسين	٤-٦ أيام	الدوكس سيكلين
٩ أيام	النيكاربازين	٤ أيام	الفلوميكوين
١٠ أيام	التولتازوريل	٣ أيام	حمض الأوكسيلينيك
٥ أيام	الماديوراميسين	٣ أيام	السيبروفلوكساسين
٥ أيام	الدايكلازوريل	١٤ يوماً	الريفاميسين
١٠ أيام	السلفاديميدين	يومان	الكوليسستين
١٠ أيام	السلفاكينوكسالين	يومان	الجنتاميسين
		٧ أيام	النيوميسين
		يومان	الأموكسيسيلين
		٢-٤ أيام	الإمبيسلين
		٤ أيام	الجوساميسين
		٣ أيام	الإريثروميسين
		٣ أسابيع	الكلورامفينيكول
		٢٥ يوماً	الفيورالتادون

فترة السحب	أهم مضادات الميكوبلازما
١٠ أيام	السبيراميسين
٣ أيام	التيلوزين
٣ أيام	التايمولين