



• الطفيليات الخارجية:


١- براغيث الكلاب:

العلاج:

تُرش الكلاب وتُرش أيضاً الحظائر والأرضيات في البيئة المحيطة بالكلب بطرق مختلفة مثل الرش أو التغطيس عن طريق استخدام أى من المبيدات التالية:


- الفيبرونيل .
- سيالوفلوثرين .
- دلتا مثرين «بيوتكس» .
- سولفاك .
- سيبرمثرين .
- الإيقرمكتين .

وكذلك ينفع جداً في التخلص من البراغيث استخدام الطوق المحتوى على الفيبرونيل أو مادة الدلتا مثرين .





٢- القراد:



العلاج:

يتم علاج الكلب والبيئة المحيطة بـ:

- الدلتا مثرين «البيوتكس» من مجموعة البيرثرويد.

- سيبر مثرين .

- بير مثرين .

- فيرونيل .

- كارباريل .

- داي كلوروفس (للأماكن وللحديقة).

- اميدوكلو برايد .

ويستحسن أن يتم رش أرضية الحظيرة وما حولها بالمالاتيون أو الدياتنون، أو الداي كلوروفوس وأن يرش الكلب أو يوضع اسبوت أون بالفلومثرين أو الإيفر مكتين أو السيبر مثرين أو يوضع على شعر الكلب الدلتا مثرين أو السيبر مثرين سواءً مسحوق أو محلول لأنهما أكثر أماناً.




٣- القمل:



قمل الكلاب نوعان، هما: القمل العارض والقمل الماص.

أ- قمل الكلاب العارض:

دورة حياة القمل تتم كلها على جلد الكلب «التزاوج ووضع البيض واليرقات والبلوغ والتزاوج مرة أخرى».



العلاج:

- يتم الرش مرتين في الأسبوع في حالة وجود القمل بأحد المبيدات الآتية: المالاثيون- السيبر مثرين- الدلتامثرين «مرة في أول الأسبوع ومرة في آخره».
- من الممكن استعمال ليسيد جاهز (Ligid Lotion) بوضعه على جلد الكلاب وتركه لمدة ساعة ثم يمشط الكلب لإزالة القمل الميت.




ب- قمل الكلاب الماص:

دورة الحياة كلها تكتمل على جلد الكلب «التزاوج ووضع البيض واليرقات والبلوغ».

العلاج:

الرش باستخدام : كارباريل - ديازينون - بيريثرويد - دلتا مثرين - سيبرمثرين - ليسيد - مالاثيون .





٤- الجرب:

أ- جرب الساركوبتس:

العلاج:

قص الشعر تماماً في المنطقة المصابة
وغسل مكان الإصابة باستخدام:

- بنزيل بنزوات .

- مالاثيون .

- إيفرمكتين ٠,٠٢

مجسم/ كجم تحت الجلد .

- أميتراز .


- بيوتكس .

- إيوراكس ٠,٥٪ لوسيون .

- صابونة كبريت .

- إكتومثرين «مرهم أو

لوسيون» ٠,٥٪ .



ملحوظة: الإيفرمكتين ممنوع في بعض السلالات مثل الكولي (الكلبة لاسي).
كما أنه ممنوع في الكلاب الصغيرة (كلاب الفنانين) وكذلك في القطط .




ب- جرب الاديمودكس:

العلاج:

تغطيس كل أسبوعين في محلول دلتا مثرين أو أميتراز أو مالاثيون .

ملحوظة:

العلاج من الممكن أن يستمر لعدة أشهر في حالة استمرار الأعراض .



الديمودكس حشرة تحب أن تعيش في بصيلات الشعر وفي الغدد الدهنية، ويجب الاهتمام بعلاجها، ويمكن الجمع بين واحد من المبيدات السابقة والإيفرمتين وأفضل مبيد للديمودكس هو الأميتراز .



أهم أدوية علاج الديدان فى الكلاب

نوع الديدان	الجرعة [مجم/كجم]	الدواء
الديدان الأسطوانية	٠,٢ تحت الجلد	الإيضمكتين
لكل الديدان الأسطوانية والشريطية	٥٠ مجم/كجم كل ٢٤ ساعة لمدة ٢ أيام	الفييندازول
الديدان الشريطية	١٠٠ مجم/كجم	النيكلوساميد
الديدان الشريطية	٥٠-٥ مجم/كجم	البرازى كوانتيل
لكل الديدان الأسطوانية والشريطية	جرعة الإنسان نفسها	الفلوفيرمال

● ملحوظة:

إذا حدث قىء للكلب من أدوية الديدان فيمكن أن يُحقن الكلب بحقنة كورتاجين ب٦ فيتوقف القىء فى الحال .

