

تتعدد الأمراض التي تصيب الكلاب ويبقى أهمها وأخطرها الأمراض الفيروسية والأمراض الطفيلية..

ومما يؤسف له أن الأمراض الفيروسية قاتلة ولكن التحصينات ضدّها تحل المشكلة

برمتها.. في حين أن باقي الأمراض تحل مشكلتها

الأدوية الحديثة.



د. مصطفى فايز

أستاذ الطب البيطري - جامعة قناة السويس

أهم الأمراض التي تصيب الكلاب

□ حصبة الكلاب.. مرض شديد الوبائية.. يصيب جميع أجزاء

الجسم ويُثبط جهاز المناعة

□ الإصابة بـ ديدان الإسكارس شائعة في الكلاب تسببها الديدان

الأسطوانية وقد تولد الأجراء ميتة جراء إصابة الأمعاء

أولاً، أهم الأمراض الفيروسية:

١- الحصبة (الديستمبر):

ديستمبر الكلاب مرض فيروسي شديد الوبائية، لذا يجب التحصين ضده، خاصة أن الفيروس يصيب جميع أجهزة الجسم، كما أنه يتكاثر في الجهاز الليمفاوي ولذا يحدث تثبيط شديد للمناعة.

وبائيّة المرض:

هذا المرض كثير الحدوث في الكلاب تحت سن سنة وخاصة في سن ما بين ٦-٣ أشهر. وتحدث العدوى عادة عن طريق الجهاز التنفسي وبالاختلاط المباشر.

الأعراض:

تنوع الأعراض ما بين أعراض عامة وأعراض تنفسية وهضمية وعصبية، وتشمل:

- حمى ٤١ م.

- فقدان الشهية.

- إفرازات أنفية وعينية.

- التهاباً في الحلق وسعالاً مع التهاب رئوي شديد.


- قيء متكرر مع إسهال.

- قد يتحسن الحيوان بعد أسبوع، ولكن ممكن أن تظهر الأعراض العصبية على هيئة شلل في الأرجل الخلفية وترنح، وأحياناً اختلالات عصبية وذلك نتيجة وصول الفيروس إلى الجهاز العصبي.

التشخيص:

- عزل الفيروس في بداية المرض من كرات الدم البيضاء.

- التعرف على الأجسام المضادة



رأينا - شديد ويصيب جميع الأجهزة.

٢- الباروفيروس

هذا المرض سببه فيروس الباروفو الذي يحب الخلايا سريعة الانقسام مثل خلايا نخاع العظام وخلايا الجهاز الليمفاوي، كما يحب خلايا القلب وكذلك خلايا الأمعاء والجهاز الهضمي وأيضاً الجهاز التنفسي.

وبائيّة المرض:

- يحدث المرض عن طريق الغذاء والماء الملوث ببراز الحيوانات المصابة.

- فيروس الباروفو للأسف مقاوم للحرارة ولكثير من المطهرات.

- يحب الفيروس التكاثر في خلايا الدم والقلب والأمعاء والرئة، وهذا ينعكس على صورة المرض في

الفيروس في سوائل الحبل العصبي.

العلاج:

- العلاج هو علاج للأعراض فقط حيث إنه لا يوجد مضاد للفيروس، ولذا نعطي محاليل ومضادات للإسهال والقيء.

- ممكن إعطاء مضادات حيوية للوقاية من العدوى الثانية ومضادات للتثبيط في الطور العصبي.

الوقاية:

إعطاء اللقاح الحي المضعف في عمر ٨ أسابيع، ويكرر بعد ٤ أسابيع، ثم بعد ذلك يكرر سنوياً، ولقاح فان جارد يعطى مناعة جيدة؛ لأن هذا الفيروس - كما

الكلاب، كما يظهر واضحًا في الأعراض.

أعراض المرض:

- في الكلاب الصغيرة (الأجراء) عمر شهرين:

- حمى.

- نفوق مفاجئ.

- صعوبة في التنفس.

- زرقة في الأغشية المخاطية.

- في الكلاب الصغيرة من عمر شهرين إلى ٤ أشهر:

- حمى.

- قيء متكرر.

- إسهال ذو رائحة عفنة.

- جفاف شديد.

- نفوق.

التشخيص:

يشخص المرض إما بالاختبارات السيرولوجي للأجسام المضادة للفيروس وإما بعزل الفيروس.

الوقاية:

- استخدام اللقاح الحي المستضعف ويعطى في نفس العمر مع لقاح الديستمبر ولقاح الالتهاب الكبدي، ويوجد الآن لقاح جامع يحمي من كل هذه الأمراض (لقاح فان جارد).

- يجب عزل الكلاب المصابة والعنية بأعمال النظافة وإجراءات التطهير للأدوات والأرضيات، وذلك باستخدام المطهرات الجيدة والفعالة مثل مركيبات الكلور.

العلاج:

- إعطاء المحاليل عن طريق الوريد لرفع كفاءة الصحة العامة وزيادة مناعة الجسم وقدرتة على التحمل ومنع الجفاف.



- التهاب الملتحمة.

- قيء متكرر.

- إسهال قد يكون مدممًا.

- ألم شديد في البطن.

- أوديميا تحت الجلد خاصة في الرأس والرقبة وكذلك عند الأرجل الخلفية.

- الكلاب التي لا يقضى عليها الفيروس وتنجو من الموت تظهر فيها عتمة في العين تختفي بعد أسبوعين.

التخدير:

- عزل الفيروس من الدم والبول والحلق.

- عمل الاختبارات السيرولوجية للأجسام المضادة.

الوقاية:

- استخدام اللقاح الحي المضعف وهو يحتوى على عترة الأرينيو فيروس ويحمى من هذا

المرض بكفاءة عالية (لقاح فان جارد).

- عزل الكلاب المريضة.

- إعطاء مضاد حيوي مثل

الأمبيسلين في التوقيت المناسب

لمنع العدوى الثانية.

- إعطاء مضادات الالتهاب مثل

الفلونكسين.

٣- الالتهاب الكبدي المعدى في الكلاب

مرض فيروسي حاد يصيب

الجهاز الليمفاوي والجهاز الدورى

والكبدي، ويسببه فيروس

الأرينيوفيرس.

وبائيه وباثولوجية المرض:

- تحدث العدوى للكلاب عن طريق

الغذاء والماء الملوث ببول ولعاب

الحيوانات المصابة.

- بعد دخول الفيروس إلى جسم

الكلب يتکاثر في الخلايا التي

يحبها وهي خلايا الكبد وخلايا

الأغشية المبطنة للأوعية الدموية

وفي الجهاز الليمفاوى.


الأعراض:

- حمى.

- فقدان الشهية.



كلب مصاب بداء الكلب (النوع الصامت)



كلب مصاب بداء الكلب (النوع التهيجي)

من أعراضه مثل مرض الصرع أو النوع العصبي لمرض الدستمبر أو الأعراض التي تشاهد عقب تناول بعض السموم وكذا التي تظهر على الكلاب الموجودة في فمها أو بلعومها أجسام غريبة.

وتحضر طرق الوقاية في سرعة إنزاف الجروح التي تكون قد تسببت عن العقر بكلب كلب وغسلها جيداً بمحلول مطهر معروف وكيفها بالنار بعد ذلك. وعموماً فبمجرد الاشتباه في إصابة الكلب بمرض الكلب يجب الإسراع في عرضه على الطبيب البيطري حتى يأمن صاحبه خطر انتقال المرض إليه دون علمه أو إلى أي حيوانات أخرى عن طريق العقر. كما يجب تحصين الكلب بالقاح السعار وهو لقاح متوافر ويعطي حماية كاملة..

ثانياً: أهم الأمراض الطفيليية:

١- ديدان الإسكارس

الإصابة بديدان الإسكارس شائعة في الكلاب والقطط، ويرجع السبب إلى الديدان الأسطوانية (التروكسوكارا).

جنونية فيعمر أي شخص أو حيوان يقابلـهـ ويـهـيمـ علىـ وجهـهـ علىـ غيرـ هـدىـ وقدـ يـلـحقـ بـنفسـهـ أـضـرارـ بـليـغـةـ ويـتـشـاجـرـ معـ أيـ مـخلـوقـ يـراهـ وـيـنبـحـ نـيـاحـاـ ذـاـ صـوتـ خـاصـ ولاـ يـقدـرـ عـلـىـ الـازـدـادـ وـيـزـدـادـ إـفـراـزـ لـعـابـهـ وـيـرـىـ ذـيـلـهـ مـلـتصـقاـ بـيـنـ الفـخـذـينـ تـجـاهـ الـبـطـنـ وـيـعـدـ مـضـىـ يـوـمـيـنـ أوـ ثـلـاثـةـ منـ ظـهـورـ هـذـهـ الأـعـرـاضـ تصـابـ القـائـمـاتـ الـخـافـيتـانـ بـشـلـ وـيـعـتـرـىـ الـحـيـوانـ الـضـعـفـ وـالـلـوـهـنـ وـيـظـلـ فـمـهـ مـفـتوـحاـ وـلـسانـهـ مـدـلـياـ وـمـحـتـقـنـاـ ثـمـ يـنـفـقـ فـيـ حـالـةـ تـشـنجـيـةـ.

أما في النوع الأصم فيكون الحيوان هادئاً ولا يصاب بالأعراض الجنونية كما في النوع الأول غير أنه يكون مكتئباً ثم يصاب سريعاً بالشلل الذي يعقبه النفق بعد ثلاثة أو أربعة أيام. ومرض الكلب مرض قتالي ويندر أن يشفى منه الكلب.

- تطهير الحظائر والأدوات بواسطة مطهرات جيدة.

٤- مرض الكلب

سبب هذا المرض فيروس، وهو كثير الانتشار في مختلف بلاد العالم. وتحدث العدوى غالباً نتيجة عقر حيوان مصاب لحيوان سليم. وتحتفل مدة الحضانة من عشرة إلى خمسة عشر يوماً وقد تطول قليلاً أو كثيراً عن ذلك، وللمرض نوعان:

- ١- نوع تهيجي.
- ٢- نوع صامت.

ففي النوع الأول يلاحظ حدوث تغيير ظاهر في عادات وطبع الكلب الصاب واحتقاره في الأمكنة المظلمة وتجاهله لصاحبـهـ ونفورـهـ منهـ وابتـعادـهـ عنـهـ وعدمـ إـطـاعـةـ أوـأـمـرـهـ كـالـعـتـادـ وأـحـيـاـنـاـ بـيـتـلـعـ الكلـبـ بعضـ الأـجـسـامـ الغـرـبـيـةـ كـالـأـحـجـارـ وـقـطـعـ الـخـشـبـ أوـ القـشـ إـلـىـ غـيرـ ذلكـ وـيـصـابـ بـعـطـشـ شـدـيدـ وـقـدـ يـتـقـيـأـ،ـ وـيـعـدـ مـضـىـ نحوـ ثـمـانـيـةـ وأـرـبعـينـ سـاعـةـ عـلـىـ الـأـعـرـاضـ سـالـفةـ الذـكـرـ يـصـابـ الكلـبـ بـأـعـرـاضـ

غسل المكان المصاب جيداً وذلك
بماء الدافئ والصابون ثم يجفف
المكان قبل وضع أحد العلاجات
المخصصة للجرب، وعادة ما يتم

العلاج بإحدى الطرق الآتية:

أ- الرش: مثل الرش بالدلتامثرين
أو الملايثين أو الأميتراز.

بـ التغطيس: مثل التغطيس فى
 محلول الجير والكبريت أو
 محلول الجامكسان أو محلول
 الدلتامثرين والفعالية لمدة طويلة،
 حيث تستمر فعالية محلول فى
 المغطس لعدة ساعات أو حتى
 يتم تغطيس جميع الحيوانات.

جـ المراهم: مثل مرهم الكبريت.

دـ الحقن: مثل حقن الإيفوميك
(الإيفرمكتين).

ولم يمكن علاج الجرب بدون
 التخلص من حشرة الجرب نفسها،
 خاصة أن الحشرة ضعيفة ولا
 تصمد طويلاً بعيداً عن الحيوان؛
 ولذا يجب علينا عموماً مراعاة
 نظافة المكان يومياً.

وتستخدم الأدوية

الآتية لعلاج حالات الجرب:

١ـ محلول الدلتاميثرين
والتيتراميثرين: يوجد فى
 الأسواق بأسماء كثيرة وهو من
 أقوى وأحسن المركبات فعالية
 فى علاج الجرب وأكثرها أماناً
 أيضاً.

٢ـ مرهم الكبريت ١٠٪.

٣ـ الأميتراز وهو من أشد المبيدات
 فعالية وأكثرها أماناً بالنسبة
 للكلاب.

٤ـ حقن الإيفومكتين.

البوبيضات فى براز الكلاب
 المصابة.

- قد توجد الديدان البالغة فى
 البراز.

العلاج والسيطرة على المرض:

- باستخدام طاردات الديدان مثل
 الفينيندازول ٢٥ مجم / كيلو
 جرام وزن أو الفلوزول.
 - من الممكن إعطاء طاردات
 الديدان قبل الولادة بـ ٣ أسابيع
 وحتى أول يومين بعد الولادة،
 وهذه الأدوية آمنة جداً ومن
 الممكن استخدام الأدوية البشرية
 المخصصة للأطفال مثل
 الإيفرمكتين.

- يجب العناية بالنظافة العامة فى
 أماكن الكلاب وتطهير الأدوات
 والأرضيات بمطهر فينول أو
 محلول صودا كاوية.
 - يجب التخلص من البراز سريعاً
 وتكرار تنظيف المكان.

٢ـ الجرب

لجرب الكلاب أنواع عديدة؛ فمنه
 الجرب العادى (جرب الجلد)
 والذى يسببه الساركوبتس
 والسوربتس، ومنه جرب
 بصيلات الشعر ويسببه
 حلم الديمودوكس وعادة
 ما يسمى بالجرب الأحمر؛
 لاحمرار الجلد.

كيف تعالج الجرب؟

قبل وضع
 الدواء على أماكن
 الجرب فى
 الكلاب يجب

وبائية المرض ودوره الحيـة:

تحدد الإصابة للكلاب عن طريق
 الغذاء أو الماء الملوث بالطور المعدى
 لبويضات الديدان، وهذه البوبيضات
 تفخس فى الأمعاء وتخترقها إلى
 الكبد، ثم تهاجر البرقات من الكبد
 إلى الرئتين فالقصبة الهوائية، ومن
 القصبة الهوائية إلى الأمعاء مرة
 ثانية، وتصبح بالغة فى خلال
 شهر.

قد تصاب الأجنحة بالطور اليرقى
 للإسكارس عن طريق المشيمة وهى
 فى بطون أمهاطها، ويصبح هذا
 الطور بالغاً فى أمعاء الأجراد
 عندما يكون عمرها حوالى ٣
 أسابيع.

الأعراض:

- قد تولد الأجراد ميتة أو تنفق
 فى الأيام الأولى من عمرها
 بالالتهاب الرئوى.

- تظهر الأعراض فى الأجراد
 أيضاً على هيئة إسهال وقيء،
 وانتفاخ فى البطن.

أعراض الإصابة فى الكلاب

الكبيرة تشمل:
 نقصاً فى الوزن
 وضعفاً عاماً
 وإسهالاً وأنيميا.

التشخيص:

- وجود

