

المختصر المفيد في مكافحة



يكتب:

أ.د. مصطفى فايز
كلية الطب البيطري
جامعة قناة السويس

مساعدتها بالمعلومات
والإرشادات من أجل تطبيق
الشروط الصحية للأمان
الحيوي في المنازل.

■ التحكم في حركة الطيور من
المزارع إلى المجازر، وتنفيذ
الاشتراطات الصحية في هذا
الشأن، والعمل على أن تكون
المجازر في المزارع أو على
مقربة منها.

■ تنفيذ الإجراءات الصحية
اللازمة عقب انتهاء الدورة
الإنتاجية كالتالي:
أ- فحوص قبل الذبح.
ب- التطهير والإجراءات
الصحية.

بدون فلسفة وكلام كبير حتى
نكافح إنفلونزا الطيور وباقى
الأمراض المعدية مكافحة صحيحة
يجب التركيز على الآتى:
■ الاجتهاد في تطبيق شروط
الأمان الحيوي في مزارع
الدواجن والتقدم التدريجي
بها واستكمال عناصر الأمان
الحيوي عنصراً بعد عنصر
بخطة مرسومة هادفة عملية.

■ المزارع التي لا يمكن تطبيق
شروط الأمان الحيوي بها
يجب مساعدتها على تغيير
نشاطها إلى نشاط آخر (تربيه
أرانب مثلاً).

■ التربية المنزلية يلزم

تطبيق
شروط الأمان
الحيوي أمر
لا مساومة
عليه.. والمزارع
التي لا تلتزم
بها يجب تغيير
نشاطها على
الفور



٢٠ مرض إنفلونزا الطيور



من أجل تحصين
فعال، يجب
التدقيق
في كفاءته،
حفظه بطريقة
جيدة، جرعااته
ال المناسبة،
متابعة الأجسام
المضادة

- ١- حتى الاستخدام في المزرعة أو التربية المنزلية.
- ٢- استعمال اللقاح بالجرعات والطريقة وبرنامجه التحصين المناسب لكل نوع من أنواع الطيور.
- ٣- متابعة مستوي الأجسام المضادة بعد التحصين معملياً للتحقق من فاعلية اللقاح وكفاءته في صد المرض.
- ٤- متابعة مستوي الأجسام المضادة بعد التحصين معملياً للتحقق من فاعلية اللقاح وكفاءته في صد المرض.
- ٥- تحديد خطة للخروج من التحصين والاعتماد على إجراءات الأمان الحيوي مبدأ استقرار الموقف الوبائي، ويمكن أن يتم ذلك مرحلياً ومن خلال تحديد مناطق يمكن وقف التحصين بها.

ج- إجراءات إزالة السبلة وعمل الكمبوزيت وعمل مكورة- والتحكم في حركة السبلة.

د- إعادة تسكين المزرعة بعد النظافة، والتطهير.

■ الاستمرار في الترصد السلبي والإيجابي والوجه لمتابعة انتشار المرض واتخاذ ما يلزم بغرض تقليل فرص دخول عترات جديدة منه إلى البلاد مع التخلص السليم من البؤر.

■ التقصي السلبي والإيجابي.

■ زيادة التوعية والإرشاد خاصة في المزارع وفي التربية المنزلية.

■ الاهتمام بالتحصينات وبالتحصين: لكي يكون التحصين مجدياً ويؤدي الغرض المطلوب منه ينبغي تطبيق الآتي:

- ١- لقاح مناسب ذو كفاءة لصد العترة المحلية (يتم معايرته بالمعامل المركزي للرقابة البيطرية على المستحضرات البيولوجية وباختبار التحدى).
- ٢- اللقاحات محفوظة جيداً ومفرولة بطريقة صحيحة