



د. مصطفى فايز
كلية الطب البيطري
جامعة قنطرة السويس

مشروع تربية العجل الرضيع تحت الأبقار المرضعة

لنجاح مشروعك.. يجب أن تكتسب الخبرة والمران في التعرف على مظاهر الصحة أو المرض في العجل والابقار

- وعليك أخي المربى أنه تتحاشى:
- الأبقار المرضعات والتي تصلح لإرضاع أكثر من عجل.
 - بوكسات واسعة أو حظائر مزودة بمرابط لربط الأبقار، وبها إصابة مناسبة (٢٠ بوكسًا على الأقل).
 - أحبال ربط الأبقار أو سلاسل مجهزة بوسائل فكها أو اتصالها بحلقات المعدود.
 - حدوث أي ضرر للأبقار أو الآدميين.
 - إحداث أي نوع من الإجهاد على الحيوانات.
 - المحافظة على الأدواء من التلف.
 - وفي هذا المشروع نحن نحتاج الآتي:
- إن الهدف من استخدام أبقار مرضعات (أمهات) هو إرضاع أكبر عدد من العجلول لتحقيق الأهداف التالية:
- الاستخدام الكفاءة للبن.
 - تحقيق معدلات نمو عالية.
 - إنتاج عجلول سليمة صحيًا.
 - الرعاية السليمة للأبقار.
 - حسن استخدام الوقت والمباني والمعدات.

للوصول إلى معدلات النمو المأمولة، افحص العجول يومياً ملاحظة التقدم في حالتها العامة أو أي أعراض مرضية



الحالب قد تقبل العجل بسهولة
وإذا لم يحدث قبول فلا تحاول
استخدامها.

■ **كيف تقدم العجل إلى بقرة حديثة الولادة؟**

■ **تأكد أولاً أن العجل**
خاصة تلك المشتراء:
- خالية من أي ظواهر مرضية.
- مقاومة الحجم والعمر.
- ذات سرة نظيفة وصحية.

- تتأكد أن العجل قد حصل على
٦ لتر سرسوب خلال ٦ ساعات من ولادته وكلما أمكن
فإنه يستمر في تناول السرسوب
لمدة ٨٤ ساعة التالية.

- لا يزيد عدد الرضع على ٤ عجول لا تزيد أعمارهم على
أسبوع بالنسبة لكل بقرة. وذلك
أخذًا في الاعتبار إنتاج اللبن

إصابة فيجب علاجها تحت
إشراف بيطري قبل استخدام
البقرة كمرضعة.

- لاحظ أن استخدام الأنواع التي
تنتج لبناً مرتفعاً في نسبة الدهن
سيتسبب عنها حالات عسر
هضم في العجل. حاول أن
تستخدم الأنواع التي تنتج لبناً
معتدلاً في نسبة الدهن (مثل
الفريزيان).

- الأبقار التي يتغذى حلبها في
المحلب بسهولة بسبب أخطاء أو
تشوهات في الضرع يمكن
استخدامها كمرضعات وذلك مثل
الأبقار ذات الثلاث أرباع أو ذات
الحلمات الضخمة أو الصغيرة أو
تلك التي تتكرر إصابتها بالتهاب
الضرع أو بطئية الحلاوة.
- الأبقار التي تقوم بالرفس في

- أعلاهً مائة ومركزات للعجل
والأبقار.
 - منطقة مخصصة للرضاعة.
 - جرائد حليب.
 - برازات أو زجاجات وحملات.
 - رقم تليفون طبيبك البيطري
تحسباً لأى احتمالات.
 - أدوية ومعدات لعلاج أى حالة
تحت الإشراف البيطري خاصة
الإسهال.
- ولنجاح هذا المشروع يجب
عليك الآتي:

أن تكون ملماً بالمعلومات وأن
تكون قد اكتسبت الخبرة والممارسة
في مجالات:

- التعرف على مظاهر الصحة أو
سوء الحالة في العجل والآبقار.
- كيفية التعامل مع الأبقار
الهائجة
- تحريك ونقل العجل.
- فهم العجل وحسن رعايتها
والقيام عليها.

وإليك أهم الإجابات عن
الأسئلة التي تقابلك أثناء تجهيز
المشروع:

- **كيف تختار الأبقار
المرضعات؟**
- استخدم دائمًا الأبقار
السليمة صحيًا الحاليية من أى
أعراض مرضية.
- تأكد من عدم وجود إصابة
بالتهاب الضرع وإذا وجدت



- تستخدم الخدمة أو السلسلة ذات القفل إذا دعت الضرورة لربط البقرة.
 - تأكد من أن كل عجل يرضع بشكل ملائم وأنه مقبول من الأم المرضعة.
 - البقرة قد تم حلبها بالكامل للأيام الأربع الأولى. وقد يكون ملائماً أن تقوم العجل الأكبر سنًا برضع الأم لمدة ١٠ دقائق أولاً لتحسين التوتر والألم الحلمات.
 - العجل يجب ألا تررضع بعضها من الأذن أو السرة أو القصيب. وقد يكون ضرورياً ربط العجل منفصلاً عن بعضها.
 - يجب أن تررضع العجل مع بعضها.
 - كل عجل يجب أن يرضع تقريرياً نفس كمية اللبن.
 - عند الولادة تحتاج إلى ٢٠٥ لتر لبن يومياً، والعجلات التي يكون وزنها من ٢٠ - ٣٥ كجم عند الولادة تحتاج ٢٠٥ لتر لبن يومياً.
 - عدد العجول لكل أم مرضعة يتحدد حسب إنتاج الأمهات من اللبن.
 - تغذية الأمهات المرضعات تكون حسب إنتاجها المتوقع من اللبن.
 - يجب أن تتحقق سرة العجل للتأكد من جفافها ونظافتها وصحتها قبل تقديم العجل للأمهات المرضعات.
 - راقب دائمًا البقرة والعجل في أثناء عملية الرضاعة في الأسبوع الأول أو حتى يتم قبول العجل بواسطة الأم المرضعة.
 - يجب أن تغذى البقرة على كمية المركبات اللازمة لها أثناء عملية الرضاعة.
- المتوقع من الأم المرضعة:
- يمكن تشجيع العجل على الرضاعة إذا تم تجويعها لمدة ٢٤ ساعة.
 - تأكد أن العجل لا تررضع للحد الذي يسبب لها التخمة وعسر الهضم.
 - تصنف العجل في مجموعات حسب العمر والحالة العامة.
 - تعطى كل بقرة العدد الذي تستطيع إرضاعه حسب إنتاجها من اللبن.
- ما أهم المعلومات التي تحتاجها أثناء المشروع؟
- العجلات الرضيعة لماشية اللحم أو ماشية اللبن تستهلك ٧ لترات لبن يومياً في حالة الوصول إلى عمر سنتين.
- العجلات التي وزنها ٣٥ كجم

التفذية السليمة للعجل والألبقار ضرورة للنجاح، والصبر والمعاملة الطيبة للأم يجعلان عملية الإرضاع والتبني سهلتين للغاية

- التفذية على العلف الأخضر إلى زيادة ناتج اللبن.
- حاول ضبط عدد العجل بالنسبة لكل بقرة كي تتأكد من أن كل عجل يحصل على ٣٠٥ لتر: ٤ لتر لبن حسب حجم العجل.
- اعمل على تجفيف البقرة قبل ٦ أسابيع على الأقل من الولادة التالية.
- افحص الصدر عند التجفيف يومياً لمدة أسبوع للتتأكد من عدم الإصابة بالتهاب الصدر أو تحويش اللبن في الصدر.
- سجل أي حالات إصابة بالضرع وأبلغها للطبيب البيطري.
- أختي المربى صاحب هذا المشروع المهم عليك أن تفهم:**
- أن الصبر والمعاملة الطيبة للأم المرضعة سيجعل عملية التبني والإرضاع عملية سهلة.
 - أن التغذية السليمة للأبقار والعجل ضرورة للنجاح.
 - أن استخدام الأبقار المصابة بالتهاب الصدر مرفوض.
 - أن الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالأبقار المرضعات والأبناء بالتبني ذو أهمية كبيرة.
 - أنه قد يكون صعباً أن تحمل الأبقار المرضعات مما يدعو إلى الاهتمام بمشكلات الخصوبة والعجل على حلها عن طريق التغذية الجيدة والرعاية السليمة.
- طبيعي وذلك خلال عدة أيام بعد الفطام.
- أن العجل جميماً مستمرة في النمو بشكل طبيعي بعد الفطام.
- في الحالات الضرورية وإذا كان ذلك ضمن إطار سياسة الرعاية بالزراعة، تحقق العجل بمستحضر مخلوط فيتامينات ولقاح ضد الالتهاب الرئوي.
- **كيف تقدم الدفعة التالية من العجل الرضيعة للأمهات المرضعات؟**
- يتم التتأكد من أن هذه العجل قد حصلت على ١٠ لتر سرسوب خلال الساعات الستة التالية للولادة.
- تتأكد من أن العجل سليمة صحيًا وتتقدم بشكل طبيعي وأن كل عجل يتناول مخصصاته من اللبن دون زيادة.
- تتأكد أن الأم المرضعة تتقبل كل العجل التي ترضعها.
- إذا كان هناك شك في تلوث بكتيري يؤدى إلى الإسهال فيخطر فوراً المسئول البيطري.
- إذا حدثت اضطرابات هضمية توقف عملية الرضاعة لمدة ٢٤ ساعة ويعطي العجل ماء دافئاً به قليل من الملح لتفادي الجفاف ويتم حلب البقرة يدوياً.
- بتقدم موسم الحليب سيقل إنتاج اللبن. وقد يؤدى التحول إلى تخرج البقرة من مكان الرضاعة بمجرد انتهاء عملية الرضاعة.
- وحاذر أن تصيبك قرون البقرة عند رعايتك لها أو للعجل.
- ولتفادي إصابة العجل بالإسهال يتم إرضاع العجل ثلاث مرات في اليوم صباحاً وظهراً وبعد الظهر وذلك في الأسبوع الأول.
- **كيف تعنى بالعجل في المشروع؟**
- للوصول إلى معدلات النمو المأمولة عليك بتنفيذية الدريس والمراكزات وتقديم المياه للعجل أخذًا في الاعتبار كمية لبن الرضاعة.
- لاحظ جيداً حالات الإسهال واضطراب المعدة واستشر طبيب البيطري.
- تتأكد أن العجل تتناول الدريس والمراكزات والماء.
- افحص العجل يومياً ملاحظة التقدم في حالتها العامة أو أي أعراض مرضية.
- تتأكد من جفاف الفرشة في كل الأوقات.
- افطم العجل فجأة في عمر ٦ أو ٨ أو ١٠ أسابيع حسب برنامج الرعاية الذي تتبعه.
- ولكن راع ما يلى:
- أن العجل يتناول كميات الدريس والمراكزات الصحيحة.
 - أن العجل يأكل ويشرب بشكل