

توصيات لربي الأغنام

د. مصطفى فايز

إن البرسيم يزيد من إفراز اللبن اللازم لرضاعة الحملان المولودة.

• رعاية النعاج العشار:

- الاهتمام برياضة النعاج العشار بالسير مدة ١-٥ ساعه يومياً، مع تجنب الازدحام أثناء الخروج من الحظائر. كما يراعى عدم تعرضها للشمس المباشرة خاصة ساعة الظهيرة. مع ضرورة توافر مياه الشرب النظيفة.

- فى الشهر الأخير من الحمل يلزم تقديم علقة إضافية للنعاج الحوامل، مع الإقلال من المواد المائية والأتبان حتى لا يمتلئ الكرش فيضغط على الحمل.

- على المربى التأكد من عدم وجود أي انسداد بالحلمات حتى يضمن نزول اللبن لرضاعة المولود، كما يزال الصوف من دخول منطقة الضرع وينظف الضرع جيداً ويجف.

• الولادة ورعاية الأم والمولود:

يمكن التعرف على قرب ميعاد الولادة بمراقبة الأم؛ حيث تكون: بطئنة الحركة- تميل للعزلة- ممتلئة البطن- متذلية الكرش- ممتلئة الضرع ومنتقصة الحلماط.

عند التأكيد من هذه العلامات تُعزل النعجة في «بوكس» الولادة

• الأم ترعى نهاراً وتنبيت ليلاً مع ولدتها

- يجب أن ترعى الأم نهاراً في حقلها، تبيت ليلاً مع حملها. - مع بدء موسم البرسيم يبدأ موسم الولادات في الأغنام؛ حيث يكون التلقح في مايو ويونيو لتلد الأغنام في أكتوبر ونوفمبر لنضمن علقة خضراء للنعاج الوالدة؛ حيث

يجب الاهتمام

برياضة النعاج العشار.. مع تجنب الازدحام أثناء الخروج من الحظائر





**على المربى
تفادى تعریض
الحملان للتیارات
الهوائیة..
والاهتمام بنظافة
وجفاف
البوکسات..
والتأكد
من حصول المولود
على حاجته من
السرسوب**

- تبیت مع نتاجها حتى صباح اليوم التالي.
- يمكن تقديم مغلى الشعیر للأمهات المرضعات بجانب العلائق الازمة.
- يجب التأكيد من حصول الوليد على كفايته من لبن الأم. وإنما لم يكن لبن الأم كافياً لتغذية المولود يمكن الاستعانة ب لبن الأبقار.
- في حالة الرغبة في عمل نظام للحملان، تُقلل رضاعتها من الأم مع تقديم علقة ناعمة ٥٠ جم/يوم تزداد تدريجياً لتصل إلى ٥٠٠ جم/يوم على أن يتم وقف الرضاعة تدريجياً، وعادة تكون الحملان قد وصلت إلى سن شهرين.
- إذا رغب المربى في خصي الحملان من الذكور بهدف التسمين يمكن إجراء ذلك في الأسبوع الأول من الولادة وذلك باستخدام حلقات كاوتش ضاغطة أو باستخدام آلة البرديزو.

(يصنع من الخشب بمساحة ٢١٠٥ سم، ويكون جاف الأرضية، ويفرش بقش الأرز النظيف) حتى تلد النعجة في هدوء.

- عادة تلد النعجة دون مساعدة خارجية، وعقب الولادة مباشرة يقطع الحبل السرى على بعد ٥ سم من سطح الجلد ثم يُطهر بصبغة اليود.
- يُترك الجنين للأم لتجفف باللعق، وهذه العملية مهمة في التعرف على المولود. بعد ذلك يُرفع باليد من الأطراف الخلفية ويضرب بخفة على الظهر للإسراع بنزول الأغشية الجنينية التي قد تسد الأنف والفم. ثم يبدأ المولود في رضاعة السرسوب الذي يحتوى على أجسام مضادة وفيتامينات ومواد غذائية لازمة له خاصة في الثلاثة أيام الأولى بعد الولادة.
- لابد من نزول المشيمة خلال ٢٤ ساعة من الولادة ولا يُستدعي الطبيب البيطري.
- يلاحظ أن أعلى نسبة لنفوق الحملان تكون في الأسبوع الأول من الولادة وبالتالي يسبب خسارة كبيرة للمربى؛ لذلك يراعى تفادى تعریض الحملان للتیارات هوائیة. كما يُهتم بنظافة وجفاف هذه البوکسات. كما يجب التأكيد من حصول المولود على حاجته من السرسوب.
- تظل الأم مع مولودها بصفة دائمة لمدة أسبوع ثم تُحجز الوليد وتخرج الأمهات للمراعى على أن