



## دليل مضادات الالتهاب

الدواء [المادة الفعالة] الشركة المنتجة	الجرعة- طرق الاستخدام	دواعي الاستعمال
Declo 5% (Diclofenac Sodium) شركة علام Dicloprima 5% شركة بريما فيت	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ٢ مل / ١٠٠ كجم للماشية والخيول.</li> <li>□ نصف مل / ٢٥ كجم للعجول والأغنام والماعز والكلاب.</li> <li>□ حقن عضل فقط.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ التهابات المفاصل والعضل والأوتار والأعصاب والروماتيزم.</li> <li>□ مضاد للالتهابات ومسكن للألام والمغص وخافض للحرارة.</li> <li>□ النزلات المعوية الحادة في العجول والحملان.</li> </ul>
Dicloflame 2.5% شركة الأبرار	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ٤ مل / ١٠٠ كجم للماشية والخيول.</li> <li>□ ١ مل / ٢٥ كجم للعجول والأغنام والماعز والكلاب.</li> <li>□ حقن عضل فقط</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ التهاب الصرع الحاد.</li> <li>□ الالتهاب الرئوي الحاد. □ بعد العمليات الجراحية ومضاعفاتها.</li> </ul>
Rheumafen جلاكسو (بشرى)	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ كبسولتة أو قمع (لبوس) مرة أو مرتين يومياً / ٥٠ كجم ويكرر كل ١٢ ساعة حتى اختفاء الأعراض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ الكبسولات واللبوس البشرى يمكن استخدامه للكلاب والقطط والحملان والعجول الرضيعات.</li> </ul>
Voltaren Ampule نوفارتس (بشرى)	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ١ أمبول ببطء في الوريد أو عضل ثلاث مرات يومياً أو عند اللزوم لكل ٥٠ كجم / وزن الجسم الحي.</li> </ul>	
Dexamethasone شركة علام	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ٥ - ١٢,٥ مل / للماشية أو الخيول يومياً.</li> <li>□ ١ - ٢,٥ مل / للعجول والمهور والأغنام والماعز يومياً.</li> <li>□ ٠,١ - ١ مل / للكلاب والقطط.</li> <li>□ حقن عضل أو وريد يومياً لمدة ٢-٥ أيام.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ في الخيول والكلاب والقطط في حالات التهاب المفاصل والأوتار والعضلات وأدمة الجلد وحافر الحصان والحساسية ولدغ الحشرات.</li> <li>□ في الماشية والأغنام والماعز في</li> </ul>

الدواء [المادة الفعالة] الشركة المنتجة	الجرعة- طرق الاستخدام	دواعى الاستعمال
<b>Dexaphan</b> (Dexamethasone) شركة فارما سويد فترة السحب ٢١ يوماً للحم. فترة السحب ٧٢ ساعة للبن.	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ الماشية والخيول والأغنام والماعز ١مل / ٢٥ كجم وزن.</li> <li>□ الكلاب والقطط ١مل / ١٠ كجم في ١مل / ١ كجم فى الصدمات.</li> <li>□ حقن تحت الجلد / عضل / فى البروتيونيم.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ حالات الكيتوزيس وحمى اللبن والتهابات المفاصل والرتة والضرع والحساسية والإكزيما.</li> <li>□ وفى حالات الصدمات Circulatory collapse</li> </ul>
<b>Phenylbutazone</b> <b>Phenylidin</b> الوطنية فترة الرفع ١٢ يوماً للحم. لا يستخدم للحيوانات الحلاب	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ الخيول ١٠مل / ٥٠٠ كجم ببطء بالوريد.</li> <li>□ الجحش ٦-١٠ مل / للمهور ببطء بالوريد</li> <li>□ الماشية ٢,٥ مل / ١٠٠ كجم ببطء بالوريد.</li> <li>□ العجول ٦-١٠ مل / للعجل.</li> <li>□ الأغنام والماعز ١مل / ١٠ كجم.</li> <li>□ الكلاب ١مل / ١٥ كجم.</li> <li>□ القطط ٢,٠ مل / قطرة ببطء بالوريد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ التهاب المفاصل، الروماتيزم، الروماتويد.</li> <li>□ التهاب العضلات الروماتيزمي.</li> <li>□ التهاب الغشاء المخاطى المبطن للمفاصل.</li> <li>□ التهاب الأوتار وأغلفة الأوتار والأعصاب والإصابات المؤلمة.</li> <li>□ فترة العلاج لا تزيد على خمسة أيام، ولا يحقن أكثر من ١٠ مل للماشية وأكثر من ٢ مل للكلاب فى مكان واحد.</li> </ul>
<b>Buta Fenil</b> شركة إيه إم التجارية (A&M)	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ٥-١٠ مل / (١-٢) فى الماشية والخيول والإبل.</li> <li>□ لا يعطى للعشار (الحوامل)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ مضاد للالتهابات ومهدئ ومسكن للآلام وخافض للحرارة.</li> <li>□ حالات المغص والحساسية والأرتيكاريا وكذلك التهابات الجهاز التنفسى والضرع والمفاصل والعضلات وصفائح الحافر وورم ما بعد العمليات الجراحية.</li> </ul>
<b>(Carprofen)</b> <b>Carprofen 5%</b> أدوية	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ المجترات ٣مل / ١٠٠ كجم وريد أو تحت الجلد.</li> <li>□ الخيول ١,٥ مل / ١٠٠ كجم جرعة واحدة فى الوريد فقط.</li> <li>□ الكلاب ١مل / ١٠ كجم مرة واحدة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ مضاد للالتهابات غير استرويدي.</li> <li>□ مسكن لتخفيف الآلام ومسكن لالتهابات الجهاز العضلى والهيكلى والالتهابات المرتبطة بالمفصل والعظم وما بعد الجراحة.</li> </ul>

الدواء [المادة الفعالة] الشركة المنتجة	الجرعة- طرق الاستخدام	دواعى الاستعمال
	□ بالحقن تحت الجلد.	□ لا يستخدم فى حيوانات الحليب. □ لا يُعطى للحوامل أو الضعفاء. □ تعطى جرعة مرة واحدة.
(phenylbutazoneSodium Salicylate) Arthenile أرابكو □ يُستخدم أساساً للخيل. □ لا يستخدم للعشار والحوامل. □ لا يستخدم للصغار أقل من ٦ أسابيع. □ لا يستخدم مع الكورتيزينات الأخرى.	□ ١٠- ٢٠ مل فى أول يومين ثم النصف حتى الشفاء فى الحيوانات الكبيرة. □ ١٠مل أول يوم ثم ٦ مل يومياً حتى الشفاء فى الحيوانات الصغيرة. □ يُحقن ببطء فى الوريد أو العضل. □ مدة الحقن لا تزيد على خمسة أيام. □ تقسم الجرعة على ٢-٣ مناطق.	□ مسكن وخافض للحرارة. □ مسكن للألام الحادة والمزمنة وآلام العضلات والمفاصل. □ التهابات المفاصل والعضلات والأوتار وحالات الروماتيزم. □ الحمى القلاعية وحمى الثلاثية أيام. □ الالتهابات الميكروبية والرتوية.
Avicort (Corticosteroid) أفيكو □ فترة السحب ٢١ يوماً للحم. □ فترة السحب ٧٢ ساعة للبلن	□ ١مل / ٢٥ كجم للخيل والأبقار/ عضل. □ ١٠مل / ١٠ كجم للكلاب والقطط/ عضل. □ ١-٣ مل/ ١ كجم لحالات الصدمة فقط. يحقن بالوريد فى حالات الصدمة والفشل فى الجهاز الدورى والحروق المنتشرة. □ لا يُستخدم للعشار لأنه يسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة عن الحقن فى العشار.	□ مانع ومضاد للالتهابات. □ علاج مساند فى حالات الكيتوزيس البقرى. □ التهاب الضرع والرحم والكلى والرتة/ وحمى النقل والمفاصل. □ يحقن فى الخيل فى حالات التهابات الجهاز الحركى والعضلى الحاد والتهابات العضلات والأوتار والتمزقات.
Arthridine فيرباك	□ حقن بالعضل أو تحت الجلد أو ببطء فى الوريد.	□ مضاد الالتهاب الاستيرويديّة قليلة. مسكن، خافض للحرارة.
Dipyron أفيكو	□ الخيل ١١- ٢٢ جم/ كجم وزن الجسم (٢,٢- ٤,٤ مل/ ١٠٠ كجم	□ لا يُعطى لحيوان اللبن واللحم. □ أقصى جرعة يومية ٣٠٠ جم/

الدواء [المادة الفعالة] الشركة المنتجة	الجرعة- طرق الاستخدام	دواعى الاستعمال
	وزن الجسم). □ الكلاب والقطط ٢٧,٥٠ مجم/ كجم وزن الجسم ٠,٥٥ مل / ١٠ كجم وزن الجسم مرتين - ثلاث مرات.	كجم فى القطط والكلاب و١٠ جم للخيول.
Adwifen (Tolfenamic Acid) أدوية	□ ٥ مل / ١٠٠ كجم وزن حي للماشية.	□ آلام والتهابات الجهاز التنفسي والعضلى والضرع والرحم والحبل السرى. □ السموم الداخلىة والحمى وجميع الالتهابات.
(Meloxicam) Anti cox II أدوية - بشرى	□ قمع شرجى واحد يومياً. □ واحد أمبول (١٥ مجم) عضل يومياً □ الجرعة الواحدة لكل ٥٠ كجم.	□ الالتهابات المصحوبة بالم في الجهاز العضلى العظمى.
Reparil - GelN (Aescin, Diethylamine Salicylate) شركة سيد - بشرى	□ تدهن طبقة رقيقة على الجزء المصاب مرة واحدة أو أكثر يومياً مع التدليك الخفيف جداً.	□ مضاد للتورم، مضاد للالتهابات □ مسكن للآلام فى حالات: الاصطدام، الرضوض، الكدمات، آلام الرقبة والعمود الفقرى، التهابات غمد الوتر.
Brufen (Ibuprofen) القاهرة للأدوية - بشرى	□ ١٢٠٠ مجم يومياً بالفم. □ الزجاجة ١٠٠مجم / ٥ مل / فى زجاجة ٦٠ مل.	□ عامل مخفف ومسكن للآلام ومضاد للالتهابات وخافض للحرارة.
Predsol (Prednisolon) برج للصناعات الدوائية / بشرى	□ ٥ - ٦٠ مجم يومياً جرعة واحدة أو مجزأة للإنسان بالفم أثناء الوجبات.	□ مضاد استيرويدي للالتهابات. □ الربو الشعبى والحساسية الصدرية. □ الحكة والإكزيما والتهاب الجلد. □ التهابات العضلات والالتهابات الروماتيزمية.



## مسكنات. مضادات التقلص. خافض الحرارة. مضاد الحساسية

الدواء [المادة الفعالة] الشركة المنتجة	الجرعة- طرق الاستخدام	دواعى الاستعمال
(Dipyrone) Analgin 50% فينويك	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ الخيول ١٠-٢٠ مل يومياً (٥-١٠ جم بحد أقصى).</li> <li>□ صغار الخيول والحمير ١٢-١٦ مل يومياً.</li> <li>□ الكلاب ٠,٥ مل يومياً.</li> <li>□ يُعطى بالوريد أو بعمق في العضل.</li> <li>□ يسبب تهيجاً شديداً عند الحقن تحت الجلد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ مسكن قوى، خافض للحرارة، مضاد للروماتيزم.</li> <li>□ مهدئ ومزيل لتقلصات العضلات المساء.</li> <li>□ المغص والتقلصات المعوية وتقلصات العضلات البطنية.</li> <li>□ التهابات المفاصل الحادة والمزمنة، روماتيزم العضلات والمفاصل.</li> <li>□ التهاب الأعصاب وأغشية العضلات، آلام الأعصاب.</li> <li>□ تهدئة الحيوان وتقليل شعوره بالألم أثناء الفحص أو العلاج.</li> </ul>
Vetragin 50 Analgin أدوية	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ١٠-٢٠ سم للخيل.</li> <li>□ ٠,٢-٠,٦ سم الكلاب.</li> <li>□ جرعة واحدة بعمق في العضل يومياً.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ مسكن، مزيل للألم، مضاد للتقلصات، خافض للحرارة.</li> <li>□ لا تزيد الجرعة على ١٠ سم في الخيول و٢٠ ملليجرام في الكلاب والقطط.</li> </ul>
فيتراجين ٥٠ (أنالجين) أدوية	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ٣-٤ مل / ٥٠ كجم للماشية، ٥-١٠ مل / للعجل، بالوريد، عضل بعمق.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ مسكن، مزيل الآلام، مضاد للتقلص، خافض للحرارة.</li> </ul>
أنالجين ٥٠ (حقن) Analgin	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ٥ مل / ٥٠ كجم / بالوريد أو عضل.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ التقلصات المعوية والعضلية، آلام المفاصل والأعصاب.</li> </ul>

الدواء [المادة الفعالة] الشركة المنتجة	الجرعة- طرق الاستخدام	دواعى الاستعمال
أريكو ميد		□ روماتيزم العضلات والأربطة.
Vetalgin (Metamizol sodium) انترفيت	□ الخيول ٢٠-٦٠ مل فى اليوم. □ الماشية ٨ مل / ١٠٠ كجم وزن. □ المهور والعجول ٥-١٠ مل. □ الأغنام والماعز ٢-٨ مل يومياً. □ الكلاب ١-٥ مل.	□ مسكن، خافض للحرارة، مضاد للتقلص، الروماتيزم. □ يؤخذ فى الوريد فى الحالات الحادة أو بالحقن العضلى أو كليهما. □ ويمكن تكرار الحقن بدون تردد فى نفس اليوم عند اللزوم.
Visceralgin inj (Tiemonium Methylsulfate) سيدكو - بشرى	□ واحد أمبول ببطء فى الوريد أو العضل ثلاث مرات يومياً أو عند اللزوم لكل / ٥٠ كجم وزن الجسم.	□ الألم والمغص الحاد من الجهاز الهضمى (الصفراء والمعدة والأمعاء) أو من الجهاز البولى (المغص الكلوى).
Atropine Sulphate سلفات الأتروبين ١% حقن أدوية	□ ٣٠-٦٠ ميكروجرام / كجم. □ ٥,٠ مل / ١٠٠ كجم، حالات التسمم □ ١ مجم / كجم ويكرر فى الحالات الشديدة/ بالوريد أو تحت الجلد.	□ المغص والتقلصات المعوية ويقلل من إفرازات اللعاب والأمعاء، يُعطى قبل التخدير للعمليات، علاج التسمم بالمركبات الفوسفورية العضوية.
Novalgin, Novacid نوفالجين، نوفاسيد سيد، هوكست	□ للكبار ١٠-٢٠ مل. □ للصغار ٥-١٠ بالوريد، عضل.	Analgesis, Antipyretic and spasmolytic.
Buscapina Compositum بورينجو	□ ٥ مل / ١٠٠ كجم بالوريد للخيول. □ ٥ مل / ١٠٠ كجم وريد / عضل للماشية والعجول. □ ١,٠ مل / ١ كجم وريد وعضل للكلاب.	□ المغص، آلام البطن، مسكن، خافض للحرارة. □ القلق، آلام البطن، المغص، التشنجات.
Buscopan Compositum (Hyoscine - N Butyl Bromide) سيد / بشرى	□ ٥ مل (واحد أمبول) ببطء فى الوريد أو يعمق فى الأرداف (عضل). □ لبوس للأطفال أكبر من ١٢ شهراً والكبار. □ يكرر ١-٣ مرات يومياً حسب الحالة.	□ مضاد للتقلصات ومسكن للآلام. □ الحقن فى حالات المغص الكلوى والمرارى والتناسلى وآلام البطن المبرحة، وحالة عسر الولادة. □ اللبوس فى حالات تقلصات الجهاز التناسلى والمعدة والأمعاء والقىء

الدواء [المادة الفعالة] الشركة المنتجة	الجرعة- طرق الاستخدام	دواعي الاستعمال
Scopyrone inj (Hyoscine, Dipyron) أدوية	□ ١٠٠ / مل / كجم بالوريد للخيل. □ ١٠٠ / مل / كجم وريد أو عضل للماشية.	□ الناتج عن انقباض وآلام المعدة. □ مسكن ومضاد للتقلصات والمغص، وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات. □ آلام البطن الناتجة عن اللكمة والمغص النفاخي أو التشنجي أو نتيجة سرعة حركة المعدة والأمعاء والصفراء والمجاري البولية.
Analgin Novalgin, Novacid, Vetalgin, Spasmoparalgin (سيد هوكست، أريكوميد، أدوية)	□ للحصان والكبار ٢٠-٥٠ مل، للصغار والمهور ٥-١٠ مل.	□ التقلصات المعوية والعضلية، آلام المفاصل والأعصاب. □ روماتيزم العضلات والأربطة. □ مسكن، خافض للحرارة.
Anti - Stamin (Diphenhydramine HcL) إيه إم التجارية A & M	□ ١٠ / مل / كجم للماشية والخيل والجمال. □ ٣-٥ مل / كجم للأغنام والماعز □ ١ / مل / ٥-١٠ كجم وزن حي للقطط والكلاب. □ للحقن ببطء في الوريد	□ مسكن للألم ومضاد للحساسية ومضاد للتقلصات والمغص وحالات الهرش والالتهابات الجلدية. □ اضطرابات الجهاز التنفسي. □ التهابات المفاصل والعضلات وصفائح الحافر.
Antistamin Avil Tavagyl Pirafen Histacure	□ ٢٠-٥ مل للكبار، ١-٢ مل للصغار، عضل أو ببطء في الوريد عند اللزوم.	□ مضاد للحساسية، مضاد للتقلصات، مسكن للألم، النفاخ الرئوي.





## أدوية التخدير والتنويم والمخدرات الموضعية!

دواعى الاستعمال	الجرعة- طرق الاستخدام	الدواء [المادة الفعالة] الشركة المنتجة
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ مهدئ ومسكن ومخدر يعطى تأثيراً خلال ٥-١٥ دقيقة من الحقن.</li> <li>□ لا يستخدم أثناء الفترة الأخيرة من الحمل.</li> <li>□ لا يستخدم فى حال انسداد المريء أو المعدة أو الأمعاء.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ٠,٥ - ٢٠ مجم / كجم وزن ١مل / ٤٠٠ كجم للماشية.</li> <li>□ ٠,١ - ٠,٥ مجم / كجم وزن: ١,٢٥ / ١٠٠ كجم للجمال.</li> <li>□ ٠,٦ - ١٠ مجم / كجم وزن: ٢-٥ مل / ١٠٠ كجم للخيول.</li> <li>□ ٣ مجم / كجم: ٠,٠٥ - ٠,١٥ مل / كجم للقطط.</li> <li>□ ٢-١ مجم / كجم وزن الكلاب.</li> <li>□ حقن عضل أو وريد.</li> </ul>	<p>Xyla Ject (Xylazine) أدوية</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ مهدئ، مسكن قوى، مخدر.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ٢-١ مل / ١٠٠ كجم / تحت الجلد، عضل، وريد (باير).</li> </ul>	<p>Comblen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ مهدئ، مسكن، راخى العضلات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ٠,٢٥ - ١ مل / ١٠٠ كجم / عضل.</li> </ul>	<p>Rompune باير</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ الحروق الخفيفة، السحجات، التسلخات، التهاب الضم القلاعى، لدغ الحشرات، تشققات الضرع والحلمة.</li> <li>□ جروح الجلد، مخدر ومسكن للألم الموضعى وأثناء الفحص الجراحى.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ يدهن المكان المصاب مرة أو مرتين يومياً.</li> </ul>	<p>Lignocaine (Lig. Hcl) Cream+ Gel النيل - بشرى النيل للأدوية والصناعات الكيمائية (بشرى)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ حساسية الجلد، جروح الضرع والحلمة، لسرعة التئام الجروح والإكزيما، الحروق، غطاء واق قبل وبعد العمليات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ توضع طبقة سميكة على المكان المصاب مع التدليك الخفيف جداً ٢-٣ مرات يومياً.</li> </ul>	<p>Mega cure Ointerment ميغا فارما</p>





## الإستيرويدات التي تستخدم منشطات نمو للحيوانات

الحيوان	نسبة الاستجابة للنمو (%)	مدة التأثير (يوم)	الجرعة (مجم)	المحتوى من الهرمونات
● العجول	١٥ - ١٠	١٢٠ - ١٠٠	٢٠ ٤٠	بنزوات الأستراديول Estrodiol Benzoate بروجستيرون Progesterone
عجلات وأبقار	١٥ - ٥	١٢٠ - ١٠٠	٢٠ ٢٠٠	بنزوات الأستراديول Estrodiol Benzoate بروبيونات التستوستيرون Testosterone Propionate
عجول اللحم	٨ - ٠	١٢٠ - ١٠٠	١٠ ١٠٠	بنزوات الأستراديول Estrodiol Benzoate بروجستيرون Progesterone
● العجول	١٥ - ١٠	٢٠٠	٤٥	إستراديول Estrodiol
عجلات وأبقار	١٢ - ٥	٩٠ - ٦٠	٣٠٠ أو ٢٠٠ أو ١٤٠	أسيئات الترنبولون Trenbolone acetate
●● العجول وعجول التسمين	٢٠ - ١٠	١٠٠ - ٦٠	١٤٠ ٢٠	أسيئات الترنبولون Trenbolone acetate بنزوات الأستراديول Estrodiol Benzoate

الحيوان	نسبة الاستجابة للنمو (%)	مدة التأثير (يوم)	الجرعة (مجم)	المحتوى من الهرمونات
الأبقار	١٥ - ١٠	١٠٠ - ٩٠	٣٦	Zeranol (هرمونات من مصدر نباتي)
الحملات العجلات والأبقار	١٥ - ١٠ ١٠ - ٣	١٢٠ - ٩٠ طول فترة الاستخدام	١٢ ٠,٢٥ - ٠,٥ يوميًا	Zeranol اسيتات الميلنجستيرون (في الغذاء) Melengestrol Acetate

- تسبب زيادة مؤقتة في السلوك الجنسي.
- فرط في نمو الثدي والضرع بعد فترة طويلة من التعاطي.



## مهدئات وقبل العمليات الجراحية «مليجرام لكل كيلو جرام وزن حي» Sedative and Premedication

الدواء	مهدئ	قبل العملية
Xylazine	٠,٥ - ١,٠	٠,٥ - ٠,١
Atropine	٠,٠٢ - ٠,٠٠٤	٠,٠٢ - ٠,٠٠٥
Acepromazine	٠,١ - ٠,٠٢	٠,٠٤ - ٠,٠٣
Butorphanol	٠,٠٣ - ٠,٠١	٠,٠٢

\* 0.02 microgram/Lb

مضادات الهياج، أدوية تستخدم في حالات الهياج الشديد في الخيول:

Centralnervous system depression in hyperexcitability conditions:

\* Diazepam 0.2 - 0.5 mg/kg (Intravenous - Intramuscular).

\* Chlorpromazine (Largactil) 2 - 5ml/200 - 300kg (IV, IM).

\* Chloralhydrate 5 - 6mg/50kg (1.5 - 4mg/kg of 70% solution).

Flunixin

أدوية تستخدم في الألم والمغص الشديد في الخيول: