

مدة إيقاف الدواء في المشيمة في فترة الجفاف

د. مصطفى فايز

أستاذ الطب البيطري - جامعة قناة السويس

المضادات الحيوية

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللحم (فترة منع الذبح)
أموكسيسيلين	حقن	٢٠ يوماً
أمبسيلين	حقن	٦ أيام
كلورتتراسيكلين كالسيوم	إضافات أعلاف	٧ أيام
كلورتتراسيكلين بايسلفات	بالضم	٣ أيام
كلورتتراسيكلين هيدروكلوريد	بالضم	١٠-١ أيام
داي هيدروستربتومايسين سلفات	حقن	٣٠ يوماً
إريثرومايسين	حقن	٣٠ يوماً
نيومايسين سلفات	إضافات أعلاف	٣٠-٧ يوماً
أوكسي تتراسيكلين هيدروكلوريد	بالضم - حقن - بالماء	٧ أيام
أوكسي تتراسيكلين	أعلاف - حقن	٥ أيام
بنسلين ج بروكسين	حقن	٣٠ يوماً
بنسيلين ج بنزاسين	حقن	د. مصطفى فايز
ستربتومايسين سلفات	مياه	أستاذ الطب البيطري
تتراسيكلين هيدروكلوريد	مياه	جامعة قناة السويس ٤ أيام

السلفات

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللحم (فترة منع الذبح)
سلفا بروموثازين	فم	١٨ يوماً
سلفا كلوربيريدين	فم - حقن	٧ أيام
سلفا داى ميثوكسين	مياه - فم - حقن	١٠-٢ أيام
سلفا كسبردازين	حقن	١٦ يوماً
سلفا ميثازين	أعلاف - مياه - فم	٧ أيام
سلفا كيتوكسالين	مياه	١٠ أيام

مضادات الديدان

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللحم (فترة منع الذبح)
أمبروليم	فم	١ يوم
فنبندازول	فم - أعلاف	٨ - ١٠ أيام
إيضمكتين	فم - حقن	٢٤ يوماً
لا سالوسين	إضافات أعلاف	٢ يوم
ليفامبوزول ريزنيت	إضافات أعلاف	٢ يوم
ليفامبوزول فوسفات	حقن	٧ أيام
ليفامبوزول هيدروكلوريد	فم	٦ أيام
مورانتل تترات	فم - أعلاف	١٠ أيام
ثيابندازول	فم	١٠ - ٢٠ يوماً

أدوية أخرى

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللحم (فترة منع الذبح)
زيرانول	حقن	٧ أيام
أيزوفلوربيردون أسيتات	حقن	٧ أيام
ملنجسترون أسيتات	حقن	٧ أيام
ميركايتوميثيل داى ثيونان	حقن	٧ أيام

مدة إيقاف الدواء في الأغنام

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللحم (فترة منع الذبح)
ليفامبوزول	فم	٣ أيام
ثيابندازول	فم	٣٠ يوماً
نيومايسين	فم	٢٠ يوماً
بنسلين ج بروكين	حقن	٩ أيام
سلفا كينوكسالين	فم	١٠ أيام

مدة إيقاف الدواء في الأبقار الحلابة

المضادات الحيوية

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللبن	مدة إيقاف الدواء قبل الذبح « ماشية حلوب »
كلوكساسيلين صوديوم	بالضرع	٤٨ ساعة	١٠ أيام
كلوكساسيلين بنزاسين	بالضرع	-	٢٨ - ٣٠ يوماً
داى هيدروستريبتومايسين سلفات	حقن - بالضرع	٧٢ ساعة	٣٠ - ٦٠ يوماً
إريثرومايسين	حقن - بالضرع	٧٢ ساعة	١٤ يوماً
كيتاسيللين بوتاسيوم	بالضرع	٧٢ ساعة	١٠ أياماً
أموكسيسيللين تراى هيدرات	فم - حقن - بالضرع	٦٠ ساعة	٢٠ يوماً
أمبسللين	حقن	٤٨ ساعة	٦ أيام
سيفايرين بنزاسين	بالضرع	٧٢ ساعة	٤٢ يوماً
سيفايرين صوديوم	بالضرع	٩٦ ساعة	٤ أيام
كلورتتراسيكلين كالسيوم	إضافات أعلاف	-	٢ يوم
كلورتتراسيكلين هيدروكلوريد	بالضم - بالمياه	-	١ يوم
كلوتتراسيكلين بيسلفات	إضافات مياه	-	٣ أيام
نوفوبيوسين	بالضرع	-	٢٠ يوماً
أوكسى تتراسيكلين هيدروكلوريد	حقن	-	١٥ يوماً
بنسلين ج بروكين	حقن - بالضرع	٧٢ ساعة	٥ - ٣٠ يوماً
ستربتومايسين سلفات	إضافات مياه	-	٢ يوم
تيلوزين	حقن	-	٢١ يوماً

السلفات

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللبن	مدة إيقاف الدواء قبل الذبح « ماشية حلوب »
سلفا كلوربيردازين صوديوم	بالضم	-	٥ - ٧ أيام
سلفا ديمثوكسين صوديوم	حقن - بالماء	-	٥ - ١٢ يوماً
سلفا كينوكسالين صوديوم	إضافات مياه	-	١٠ أيام

مضادات الديدان

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللبن	مدة إيقاف الدواء قبل الذبح « ماشية حلوب »
فنبندازول	بالضم	-	٨ أيام
إيفرمكتين	حقن	-	٣٠ يوماً
ليفاميزول هيدروكلوريد	حقن	-	٧ أيام
مورانتل تترات	بالضم	-	١٤ يوماً
ثيابندازول	بالضم - إضافات أعلاف	٩٦ ساعة	١٢-١٤ يوماً
أمبروليم	إضافات مياه - إضافات أعلاف	-	١ يوم

أدوية أخرى

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللبن	مدة إيقاف الدواء قبل الذبح « ماشية حلوب »
فيروسيميد (مدر للبول)	بالضم	٤٨ ساعة	٢ يوم
هيدروكلوروثيازيد (مدر للبول)	حقن	٧٢ ساعة	١٠ أيام
تراي بلينامين هيدروكلوريد (مضاد للحساسية)	حقن	٢٤ ساعة	٤ أيام

مدة إيقاف الدواء في الدواجن « إضافات أعلاف »

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللحم (فترة منع الذبح)
نيتروفورازون	إضافات أعلاف	٥ أيام
نوفوبوسين	إضافات أعلاف	٤ أيام
أوكسي تتراسيكلين	إضافات أعلاف	٥ أيام
روبندين هيدروكلوريد	إضافات أعلاف	٥ أيام
سبكتينومايسين	إضافات أعلاف	٥ أيام
ستربتومايسين	إضافات أعلاف	٤ أيام
سلفا دا ي ميثوكسين	إضافات أعلاف	٥ أيام

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللحم (فترة منع الذبح)
سلفا ميثازين	إضافات أعلاف	١٠ أيام
سلفا كينوكسالين	إضافات أعلاف	١٠ أيام
تتراسيكلين هيدروكلوريد	إضافات أعلاف	٤ أيام
حمض الأرسانيك	إضافات أعلاف	٥ أيام
كلورتتراسيكلين	إضافات أعلاف	واحد يوم
إريثروميسين	إضافات أعلاف	١-٢ يوم
فيورازوليدون	إضافات أعلاف	٥ أيام
جنتاميسين سلفات	عن طريق الحقن	٣٥ يوماً
هالوفيجينون	إضافات أعلاف	٤ أيام
مونيسين	إضافات أعلاف	٣ أيام
نيومايسين	إضافات أعلاف	٥-١٤ يوماً
نيكاربازين	إضافات أعلاف	٤ أيام

مدة إيقاف الدواء في الدواجن «إضافات أعلاف»

اسم المستحضر	طريقة الاستخدام	فترة سحب الدواء من اللحم (فترة منع الذبح)
حمض الأرسانيك	إضافات أعلاف	٥ أيام
كلورتتراسيكلين	إضافات أعلاف	واحد يوم
كلو بيدرول	إضافات أعلاف	٥ أيام
إريثروميسين	إضافات أعلاف	واحد يوم
فيورازوليدون	إضافات أعلاف	٥ أيام
نوفوببوسين	إضافات أعلاف	٤ أيام
أوكسي تتراسيكلين	إضافات أعلاف	٥ أيام
سلفا داى ميثوكسين	عن طريق الحقن	١٠ أيام
سلفا كينوكسالين	إضافات أعلاف	١٠ أيام
تتراسيكلين هيدروكلوريد	إضافات أعلاف	٤ أيام