

## مشروع تربية الأرانب



د. مصطفى فايز  
كلية الطب البيطري  
جامعة قناة السويس

يراعى فى اختيار نوع الأرانب عند بدء التربية تحديد الغرض من التربية حسب الأسواق المحيطة بالمنطقة فإن كانت تحتاج إلى أنواع كبيرة الحجم فيمكن للمربي أن يختار الأنواع: فالمش، جاينت فلاندر، أو الشنشلا أو البوسكات، وتتراوح أوزانها ما بين ٤-٦ كجم، وإذا كانت الأسواق تتطلب أنواعاً متوسطة الحجم والتي تتراوح أوزانها ما بين ٣-٤ كجم فيمكن تربية البضرن الأزرق أو الانجوراه، أما الأنواع الصغيرة الحجم فأغلبها الأنواع المحلية: البلدى الأبيض أو الأحمر أو الأسود والجزيرة الأبيض، وعموماً يمكن الحصول على هذه الأنواع من محطات التربية الحكومية أو من جمعيات التربية المتخصصة.

توفر على المربي الجهد والوقت لأنها صالحة للإنتاج مباشرة.


### التربية:

يكتمل النمو الجثمانى للأرانب عند عمر ٥ - ١٢ شهراً حسب النوع فالانواع الكبيرة الحجم تستخدم للتربية عند عمر ٩ - ١٢ شهراً والمتوسطة من ٧-٩ أشهر والصغيرة الحجم يمكن استخدامها عند عمر ٥-٧ أشهر.

- أن يتم ذلك بالحصول على ذكر واحد وعدد ٥ إناث صغيرة الحجم بعد الفطام مباشرة، وهذه الطريقة تفيد المربي المبتدئ لكى يصبح ملمّاً بطبائع الأرانب متدرجاً على خدمتها ورعايتها قبل أن تبدأ الإنتاج.  
- أن يبدأ المربي بتربية أرانب بالغة وناضجة جنسياً (قادرة على التزاوج وإنتاج النسل)، وهذه الطريقة وإن كانت مكلفة إلا أنها

هذا ويجب على المربي أن يراعى الآتى:

- أن يبدأ التربية بنوع واحد حتى يركز عنايته به.  
- أن يكون القطيع خالياً من الامراض خاصة الجرب وتصمغ الأذن، وأن تكون بادية النشاط والحيوية ذات كفاءة غذائية وتناسلية عالية وتمتاز بمقاومتها للأمراض ويمكن تكوين القطيع بطريقتين:



## على مربى الأرانب أن يبدأ التربية بنوع واحد.. وأن يكون القطيع خالياً من الأمراض، خصوصاً الجرب وتصمغ الأذن

تضع صغارها خارج صندوق الولادة أو أن بعضها لا يندف من شعره ما يكفي لتغطية الصغار حديثة الولادة فتموت من البرد، ويمكن تفادي مثل هذه الحالات بوضع الصغار في صناديق الولادة وقد يندف كمية من الشعر من أسفل بطن الأم لتغطية الصغار بها.

### معاملة صغار الأرانب:

في الولادة العادية تترك الأمهات مع صغارها مدة كافية للراحة ثم تخرج الأم من المسكن لفحص

البرسيم وعمرها ثلاثة أسابيع وتبدأ الأم في الاستعداد للولادة التالية، ويمكن تقديم الأنثى للذكر لتلقيحها بعد الولادة مباشرة وإن كان بعض المربين يفضلون إعطاء الأم فرصة قصيرة لاسترداد قوتها، ومتوسط فترة الحمل ٣٠ - ٣١ يوماً ولذلك يستحسن وضع صناديق الولادة في مسكن الأنثى بعد اليوم الخامس والعشرين من التلقيح وتفرش بكمية مناسبة من القش.

ويجب مراعاة الإناث التي حل موعد ولادتها إذ إن بعضها قد

ويراعى عند موسم التزاوج أن تنقل الإناث المراد تلقيحها إلى مسكن الذكر وليس العكس، على ألا يقوم الذكر بتلقيح أكثر من أربع إناث كل أسبوع حتى لا ينعكس في وقت مبكر، ويلاحظ إعادة الإناث إلى مساكنها بعد أن يلحقها الذكر مباشرة، ويستحسن عرض الأنثى على الذكر في اليوم الثاني للتأكد من تمام التلقيح، ويمكن للمربي المتضمن التأكد من حدوث الحمل بجس أسفل البطن باليد؛ حيث تظهر الأجنة في مؤخرة البطن في حجم حبات الفول، ومن المعروف أن موسم الإنتاج في الأرانب يبدأ من سبتمبر وينتهي في أبريل ومايو من العام التالي حيث يتوافر البرسيم بكثرة، وتترك الأم لإرضاع صغارها لنحو أربعة أسابيع حيث تكون الصغار قد بدأت التغذية على

على شكل صندوق مستطيل الشكل له أرجل مرتفعة عن سطح الأرض بنحو ٣٠ سم لتسهيل عملية التنظيف والتطهير التي تجرى صباح كل يوم باستمرار ويتراوح طوله ما بين ١٠٠ - ١٥٠ سم وعرضه ٦٠ - ٨٠ سم والعمق ما بين ٥٠ - ٦٠ سم تكون جوانبه مغطاة بالسلك

الشبكي الضيق أو بالخشب البغدادي أو السلك والخشب معاً والقاع عادة من الخشب البغدادي وبين كل منها نحو ٨ سم لتسقط من بينها مخلفات الأرانب.

ويكون للصندوق غطاء عبارة عن إطار من الخشب مشدود عليه سلك شبكي ضيق ومثبت بمفاصل ويفتح لأعلى، وعادة يضم هذا النوع من المساكن جزئين؛ جزءاً للتغذية والتريض وآخر للولادة وتربية الصغار، وهذا الجزء المخصص للولادة يكون مقفولاً بالخشب من كل الجوانب أو قد توضع صناديق للولادة بطول ٥٠ سم وعرض ٣٠ - ٤٠ سم وارتفاع ٣٠ - ٤٠ سم وبه فتحة جانبية لدخول وخروج الأرانب قطرها ٢٠ سم، وارتفاع من قاع الصندوق ١٥ - ٢٠ سم



صغارها (قبل الفحص تدعك الأيدي في فروة الأم المراد فحص صغارها أو في روئها) ويحسن التخلص من الأفراد الضعيفة وينقل الزائد لتربيته تحت إناث أخرى حتى لا يبقى للأم إلا العدد الذي يمكنها رعايته وتربيته وهو يتراوح ما بين ٦-٨ صغار، وبعد ذلك تعاد

الأم إلى مسكنها وتعطى قليلاً من البرسيم مثلاً لتشغل به عن اكتشاف ما حدث بصغارها؛ لأن بعض الأمهات شديدة الحساسية وقد تقضى على الصغار إذا اشتبهت في حدوث أي تغيير في العش أو اشتمت رائحة أخرى، ولذلك عند نقل أو الكشف على الصغار تدعك الأيدي كما سبق ويتم ذلك أيضاً في الثلاثة أيام الأولى للموضع مباشرة.

ويلاحظ أن الأمهات التي تأكل أو تقتل صغارها تعطى فرصة أخرى فإن تكرر ذلك وجب ذبحها أو بيعها لحماً، وعندما تصل الصغار إلى عمر ٤-٨ أسابيع تباع بعد حجز الأفراد الممتازة للتربية والإحلال في القطيع وكذلك يجب

### البدء بأفراد

### ناضجة.. قادرة على

### التزاوج والإنتاج..

### يوفر على المربي

### الجهد والوقت.. وإن

### كان ذلك مكافئاً

### نسبياً

مراعاة فصل الذكور عن الإناث في الشهر الثالث من العمر تقريباً.

### مساكن الأرانب:

يمكن تربية الأرانب في مساكن تقام بطرق متعددة مختلفة إلا أن أبسط مسكن للأرانب هو مكان

جدول رقم [١]				مادة العلف
أرانب نتاج بعد الضطام أو إناث غير عشار أو ذكور مستعملة في التلقيح		أرانب عشار أو مرضعات أو ذكور مستعملة في التلقيح		
نموذج (٢)	نموذج (١)	نموذج (٢)	نموذج (١)	
%	%	%	%	
٢٥	٢٠	٣٠	٢٠	شعير
٢٥	٢٠	٣٠	٢٠	ذرة شامى
٢٠	٢٠	١٥	١٥	نخالة قمح
-	٢٠	-	١٥	رجيع كون
-	٢٠	-	٢٠	سن عدس أو دق فول
٢٠	-	٢٥	-	كسب قطن مقشور
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	المجموع

وإذا لم يتوافر الدريس فيمكن إعطاء الأرانب دراية أو ذرة سكرية أو علف الفيل.

ويعد البرسيم الحجازى من أحسن الأغذية الصيفية للأرانب.. وفيما يلي بعض النماذج من العلائق المركزة للأرانب كمال فى الجدول رقم [١].

ويضاف إلى كل نموذج ٢.٠٪ مسحوق جيرى، ٥.٠٪ مخلوط معدنى ٥.٠٪ ملح طعام، ويفضل وضع العليقة فى المعالف أمام الأرانب لتتناول ما تشاء، مع ملاحظة أن تكون المادة الخضراء متوافرة ما أمكن ذلك.

#### سقى الأرانب:

بعض المربين يقوم بسقى الأرانب فى مواعيد معينة إلا أن الأفضل ترك الماء النظيف فى أوان خاصة أمام الأرانب طوال الوقت لتشرب حسب الحاجة.

ويمكن فتح هذا الصندوق من أعلاه كلما استدعى الحال ذلك.

#### التغذية شتاء:

يعتبر البرسيم الغذاء المناسب للأرانب فى فصل الشتاء سواء للأرانب الكبيرة أو النتاج، ويلاحظ أن يكون البرسيم خاليًا من الحشائش الضارة من الحندقوق والكبر، كما يلاحظ تطاير الندى من عليه حتى لا يسبب نفاخًا للأرانب، ويجب أن لا يكون مخمرًا نتيجة لتكدسه، ويوضع معلقًا بحالة تسمح بتناوله حتى لا يصيبه التلوث من البول والروث.

يمكن تغذية الأرانب على البرسيم فقط إذا كان سعره منخفضًا، أما إذا كان سعره مرتفعًا أو غير متوافر بكثرة فيمكن أن تحل العليقة المركزة محل جزء من البرسيم يوازى ثلث القيمة الغذائية للعليقة، وذلك بإضافة علف مركز بعد أن يربط قليلا باللبن

الفرز، كما يمكن استخدام الجزر والبطاطا ومخلفات حدائق الخضر وخاصة الأوراق الفضية والخبز الجاف.

#### التغذية صيفًا:

يجب أن يحرص مربو الأرانب على تحويل جزء من البرسيم الزائد شتاء إلى دريس لاستعماله صيفًا،

