

تحتاج الكلاب إلى رعاية خاصة، وفحص دقيق لتنقلي  
إصابةها بأية مرض، ومعلوم أن الوقاية خير من العلاج.  
أما في حال وقوع أمراض، من أى نوع، فإن  
في السطور التالية طرق علاجها،  
مع التعريف بها، وبمسبقاتها،  
وأعراضها..



# الأمراض في الكلاب .. وطرق الوقاية والعلاج

- أثناء قياس درجة الحرارة أو الحقن عند إعطاء المستحضرات الطبية تقيس درجة الحرارة، بالترمومتر الطبي عن طريق فتحة الشرج (يجب عدم ترك الترمومتر حتى لا ينزلق إلى الأمعاء الغليظة).
- ويجب تقليم الأظافر بصفة مستمرة، باستخدام قلمة الأظافر الخاصة بالحيوان.
- يجب استحمام الحيوان على

## د. مصطفى فايز

### الفحص:

- يجب فحص الكلب على فترات منتظمة؛ وذلك للتأكد من صحته وخلوه من الطفيليات الخارجية أو الإصابات الجلدية بالفطريات أو الحرب؛ ولكى يسهل علاج الأمراض.
- كما يجب فحص الأسنان وتنظيفها كل أسبوع على الأقل، وكذلك تنظيف الوجه يومياً أو على الأقل كل أسبوع.

كلب إلى آخر أو غير مباشر عن التراب أو البذور من الحديقة فترات، ويمكن استخدام طريق الأدوات. الصابون الخاص بالكلاب أو والخشائش. الشامبو.

#### الأعراض:

فترة الحضانة تتراوح من ٦ - ٩ أيام. وتبداً الأعراض بارتفاع درجة حرارة الجسم مع بداية ظهور المرض لمدة ٣ أيام، ثم تنخفض لبضعة أيام أخرى ثم ترتفع وتستمر لمدة ٧ أيام، التهابات وإفرازات صديدية بالأعين والأنف، ظهور أعراض عصبية، وهي مميزة مثل تحريك الرأس حركة اهتزازية والتلفاف القوائم الخلفية حول بعضها وتسمى «Jerky» مع صعوبة في التنفس والضعف العام والهزال والامتناع عن الطعام. في بعض الأحيان يظهر شلل

اللثاء أو الضرس من الأسنان واللثاء.

#### ٤- الأسنان:

يجب فحص الأسنان وتنظيفها مرة كل أسبوع على الأقل. هذه العملية تصير سهلة عندما يتبع الكلب عليها وهو ما زال جروًا صغيراً.

#### أمراض الكلاب:

##### أولاً: الأمراض الفيروسية:

١- الديستمبر (حصبة الكلاب): مرض فيروسي وبائي سريع الانتشار، وهو يصيب الكلاب الصغيرة العمر وغير المصننة ضد المرض.

يسببه فيروس من نوع الباراميكنزو وينتقل مباشرة من

#### التنظيف اليومي والروتيني:


##### ١- العينان:

لا يقتصر التنظيف على جسم الكلب فقط، ولكنه يتعدى ذلك بالكشف على العينين؛ للتأكد من خلوهما من الالتهابات، وإذا لاحظت وجود أحمرار في العينين أو وجود حول بهما انتظار حتى نهاية اليوم. عند استمرار المشكلة سارع بعرض الكلب على الطبيب البيطري. لا تستخدم قطرة العيون المستخدمة في علاج الإنسان إلا بعد استشارة الطبيب البيطري.

قد يكون سبب المشكلة دخول جسم غريب في العين يقوم الطبيب بعلاجه بسهولة.

##### ٢- الأذنان:

يجب تنظيف الأذن الخارجية بقطعة قطن مبللة بالماء. إذا لاحظت وجود كميات زائدة من الشمع داخل قنوات الأذن، حاول التخلص منها قدر المستطاع باستخدام أصابعك أو قطعة قطن مبللة. وعندما تلاحظ ظهور علامات الألم على الكلب، أو عندما يشيخ بوجهه أثناء تنفيذ العملية السابقة اتصل بالطبيب البيطري. قد يرجع السبب إلى انسداد قنوات الأذن بسبب تسرب بعض



العلاج:

لا يوجد علاج نوعي ولكن يعطى  
الحيوان المصاب ما يلي:

- مضاد حيوي قوى مثل أمبيسلين  
في العضل ٢٥ ملجم/كجم  
يومياً لمدة ٥ أيام مقسمة على  
جرعتين.

أو كلورا مفييكول ٢٠-١٠  
ملجم/كجم فى العضل لمدة ٥  
أيام كل ١٢ ساعة.

## علاج الإسهال وتطهير الأمعاء بمستحضرات المطهرات المعوية والكافولين والبكتين.

## ٤- إعطاء المحاليل الطبية والسوائل المعقمة.

إعطاء أدوية مضادة لللتصاقات  
مثل سلفات أتروبين - ٨٨ - ١١٠  
ميكرограм/كجم من وزن  
الجسم في العضل أو تحت  
الجلد.

## الوقاية:

٣- التهاب الكبد الوبائي، في الكلاب:

مرض وبائي فيروسي، وهو يصيب الكلاب في جميع الأعمار، ويتميز باحتقان الأغشية المخاطية وزيادة الزمن النزفي أو إطالة زمن تجلط الدم، وهبوط حاد في الدورة الدموية.

تنقل العدو عن طريق الأطعمة  
الملوثة بالإفرازات المحتوية على  
الفيروس، ومخالطة الكلاب السليمة



يجب فحص الحيوان  
على فترات دورية..  
والكشف عن  
أسنانه.. وملاحظة  
أكله وشرابه..  
وقياس حرارته..  
والعناية بنظافته

المقدمة

- اتباع الشروط الصحية: مثل عدم مخالطة الكلاب السليمة للمربيضة، وعزل الأفراد المريضه فوراً، وعدم استخدام الأدوات غير المخصصة للكلاب، التطهير الدائم لمساكن الكلاب.
  - يعطى لقاح ضد المرض في عمر ٦-٢ أشهر ويكرر سنوياً، مع عدم إعطاء اللقاح أثناء انتشار الوباء.
  - إعطاء الدموية وأدوية موسعة للشعب الهوائية.
  - توفير الشروط الصحية.
  - تظهر الأعراض في عدة صور:
    - التهاب بعضلة القلب تؤدي إلى ظهور حالات الموت المفاجئ، وخاصة عند عمر ٤ - ٨ أسابيع.
    - التهابات حادة بالأمعاء، وهذه

٢- البارفو فيرس:

مرض فيروسي يؤدي إلى التهابات معوية حادة وإسهال مدمم في جميع الأعمار وخاصة الصغار. وتنقل العدوى عن طريق تناول أطعمة ملوثة بالفيروس عن طريق البراز.

تم على القوائم الخلفية، وظهرت خشونة بالوسائل القرنية للقوائم الأربع. وأيضاً قد يحدث تبول لإرادى، والمرض يمكن أن يصيب الأفراد متقدمة السن.

## العلاج:

لا يوجد علاج نوعي لهذا المرض؛ حيث إن المسبب فيروس.

- يعطي للكب المريض الآتي:
  - مضاد حيوي بالع襁ل لمدة ٥ أيام.
  - إعطاء الأدوية المضادة للتقلصات.
  - العضلية مثل الأنثروبين.
  - إعطاء مخفضات للحرارة.
  - إعطاء محاليل طبية ( محلول ملحى، جلوكوز، محلول رينجرز).
  - إعطاء أدوية منشطة للدورة الدموية وأدوية موسعة للشعب الهوائية.

- توفير الشروط الصحية.

لشهر اذعراض في هذه صور.  
- التهاب بعضلة القلب تؤدي إلى  
ظهور حالات الموت المفاجئ،  
وخاصّة عند عمر ٤ - ٨

- التهابات حادة بالأمعاء، وهذه الأعراض أكثر انتشاراً وتظهر في حميم الأعمار.

- قيء مستمر والامتناع عن تناول الطعام والشراب.

- خشونة الجلد والإصابة بالجفاف.
- يظهر النفوغ خلال يومين بعد ظهور الأعراض.



#### **الأعراض:**

الأعراض مشابهة لمرض البارفو مع إسهال مائي شديد، وفي بعض الأحيان يكون مدمماً وبه مخاط وله رائحة كريهة جداً.

#### **العلاج:**

لا يوجد علاج نوعي ولكن يعطى الحيوان المستحضرات كما في المرض السابق.

#### **٥- مرض الهيربس:**

مرض شديد الخطورة يصيب الأجزاء حديثة الولادة مباشرة عن طريق الأم المصابة، هو مرض يسببه فيروس من نوع هيربس. تنتشر العدوى عن طريق إفرازات الأم المصابة.

#### **الأعراض:**

- نفوق شديد أو مفاجئ للإجراء حديثة الولادة.

#### **العلاج:**

لا يوجد علاج نوعي ولكن يعطى مضادات للتغذيف وأتروبین.

#### **الحيوان الآتي:**

- مضاد حيوي.

- خافضات للحرارة.

- محليل.

- مستحضرات الكورتيزون، مثل ديكساميثازون بمعدل ٢٠٢ ملجم/كجم.

#### **الوقاية:**

يعطى الحيوان لقاهاً مخصصاً للوقاية في المنشط الموبوء التي يتكرر ظهور المرض فيها.

#### **٤- الالتهاب المعوي الفيروسي:**

مرض وبائي شديد العدوى يسببه فيروس من نوع كورونا ويتميز بالقيء والإسهال.

للكلاب المريضة، أو استخدام مساكن حيوانات مريضة، أو أدوات دون تطهيرها.

#### **الأعراض:**

- فترة الحضانة من ٩-٥ أيام.

- ارتفاع درجة الحرارة لمدة ستة أيام أو تزيد عنها.

- ظهور التهابات حادة بالأعين

والأنف مع إفرازات مائية.

- الإحساس بالعطش والت kakal

على شرب الماء.

- اضطرابات في الجهاز الهضمي والتهاب الكبد أو تضخمه في بعض الأحيان.

- ظهور بقع (نزفية) على اللثة مع احتقان الحلق والزور.

- في بعض الأحيان تظهر أوديميا تحت جلد الرأس أو الرقبة أو الجذع.

#### **الوقاية:**

إعطاء اللقاح الخاص بالمرض كل ٦-٨ أشهر في المناطق الموبوءة.

#### **٢- السالمونيلا:**

مرض بكتيري يصيب الكلاب ويؤدي إلى التهابات معوية حادة مع إسهال وجفاف تسببه مجموعة كبيرة من بكتيريا السالمونيلا، وأهم مصادر العدوى تناول أطعمة أو شراب ملوث بهذه الميكروبات، أو تناول لحوم وألبان من حيوانات مصابة مثل الماشية.

#### **الأعراض:**

إسهال حاد مع إعياء شديد، مغص حاد وجفاف. نسبة النفوق مرتفعة في الأجراء.

#### **العلاج:**

- يعطي الحيوان مضاداً حيوياً مثل كلورامفينيكول بمعدل ٥٠ ملجم/كجم من وزن الجسم عن طريق الفم مقسمة على ثلاثة جرعات يومياً لمدة ٥ أيام، أو يحقن الحيوان في العضل بمعدل ١١ ملجم/كجم من وزن الجسم يومياً لمدة ٥ أيام.

- يعطي الحيوان سوائل ومحاليل طبلية.

- إعطاء مضادات الإسهال الموضعية عن طريق الفم.

#### **الوقاية:**

- اتباع الإجراءات الصحية.  
- عزل الحيوانات المريضة فوراً وتطهير أماكنها.  
- لا يقدم للحيوان أطعمة حيوانية إلا معروفة المصدر.

#### **العلاج:**

- اتباع الإجراءات الصحية عند ظهور المرض، وسرعة عزل الحيوان المريض.

- إعطاء مضاد حيوي بنسلين ٢٢٠٠-١١٠٠ وحدة/كجم من وزن الجسم، ستريتوومايسين ٢٢-١١ ملجم/كجم في العضل لمدة ٥ أيام.

- إعطاء ستريتوومايسين للكلاب السليمة إذا ظهر الوباء؛ وذلك ٢٢-١١ ملجم/كجم في العضل لمدة ٥ أيام.

- يعطى محاليل طبلية مع محلول لكتات (١٧، ٠ مولار) وكذلك فيتامين «ب».

- يمكن أن تظهر الأعراض عند عمر ٨-١٠ أسابيع.

- الأعراض في الإناث كثيرة: التهابات في الجهاز التناسلي، التهابات بالأنف، وفي بعض الأحيان يحدث إجهاض للأمهات الحوامل أو يولد أجراe ناقصة النمو. أما في الذكور فيؤدي إلى العقم.

**العلاج:**  
كما سبق.

**الوقاية:**  
اتباع الشروط الصحية.  
لا يوجد لقاحات ضد المرض.

#### **ثانياً: الأمراض البكتيرية:**

##### **١- الليبيتوسيبريا:**

تسببه بكتيريا حلزونية تسمى ليبيتوسيبرا. تنتقل العدوى عن طريق تلوث الأطعمة ومياه الشرب ببول حيوانات مريضة خاصة الفئران.

#### **الأعراض:**

- فترة الحضانة ١٥-٥ يوماً.  
- ارتفاع في درجة الحرارة يصل إلى ٤٠-٥٠ مع ضعف عام وغثيان وقيء.

- التهاب الجفون، أصفرار بياض العين مع تغير في لون البول ويصبح أحمر داكناً.

- في الحالات المتقدمة تظهر قرح باللثة وقيء مدمم مع إسهال.

- التهابات بالكلية وألام شديدة بالقطن.



## **تصاب الكلاب**

### **بعدة أمراض**

#### **فيروسية..أشهرها**

#### **الحصبة..التهاب**

#### **الكبد الوبائي..**

#### **الالتهاب المعوي..**

## **الهربس**

### ٣- مرض الإجهاض المعدى (البروسيللا):

**الأعراض:**

- الإجهاض في الإناث والتهاب الخصية والعقم في الذكور.  
إفرازات رحمية غزيرة وإجهاض في الإناث في الثلث الأخير من الحمل.

- تورم الغدد الليمفاوية.  
- ارتفاع في درجة حرارة الجسم، متوجة (تنبُّد في الارتفاع).

**العلاج:**

العلاج صعب في أغلب الحالات، ويعطى الحيوان استريليتومايسين وريماقابين لمدة ثلاثة أسابيع.

**الوقاية:**

- يعطى الحيوان اللقاح الخاص بالمرض في الأماكن الموبوءة.

- يجب إجراء الاختبارات السيرولوجية، والتخلص من الحيوانات الحاملة للمرض، واتباع الإجراءات الصحية.

### ٤ - الدن:

يصاب الكلب بالسل الأدمي والحيواني، وتنتقل العدوى للكلاب عن طريق مخالطتها للحيوانات المصابة أو الإنسان المصابة، وكذلك نتيجة تناول أطعمة ملوثة باليكروب وخاصة اللحوم والألبان من حيوانات مصابة، كذلك تنتقل العدوى عن طريق الهواء والرذاذ المحمل باليكروب.

**الأعراض:**

- ضيق في التنفس وفقدان الشهية.

- الضعف والهزال وإصابة الرئة

عند التشخيص بأشعة أكس وكذلك الكبد.

**العلاج:**

لا جدوى من العلاج، ويجب إعدام الكلب، واتباع الشروط الصحية من حيث التخلص السليم من الجثة وإجراءات التطهير.

### ثالثاً: الأمراض الفطرية:

#### أولاً: الفطريات السطحية:

وهي تصيب الجلد والشعر في أجزاء مختلفة من الجسم وتنتقل إلى الإنسان عن طريق اللمس والمخالطة.

#### ١- الرينج وورم أو مرض القوباء الحلقة:

ينمو في الطبقة الكيراتينية للجلد وبصيلات الشعر ويسببه أنواع فطر الميكوس-بوريم وفطر



صحيحة (بإضافة مسحوق هيدروكسيد الكالسيوم).  
- إعطاء الحيوان مضاد الدوستاريا (ميترورنيدازول) عن طريق الفم بمعدل ٣٠ - ٦٠ ملجم/كجم من وزن الجسم، وتقسم الجرعة اليومية إلى مرتين.

#### طفيليات الدم والأنسجة:

##### ٢- مرض البابيزوز:

يسبّبه طفيلي البابيزيا والذي يعيش بدم الكلاب. والبابيزيا الكلبية تصيب بشدة الكلاب الصغيرة وتسبّب موتها، وتسبّب ضعف المناعة في الكلاب الكبيرة.

##### الأعراض:

نزيف الفم وتغيير لون البول إلى اللون البنى العبرى، وتهوى إلى تضخم في الطحال والصفراة ونقص وزن الجسم، وزيادة ضربات القلب والتنفس والأثنيما.

##### العلاج:

- علاج بمستحضر أسيتات الدياميدينزين بمعدل ٢،٥ ملجم/كجم من وزن الحيوان، ويعطى تحت الجلد أو في العضل جرعة واحدة. وكذلك مستحضر فين أميدين ١٥ ملجم/كجم من وزن الحيوان تحت الجلد على يومين متتاليين. لكن يجب الحرص في حساب الجرعة لأنّه دواء قوى وشديد على الكلاب.

- كما يجب القضاء على القراد



## يجب وقاية الكلاب من الأمراض البكتيرية وغيرها؛ لتفادي خطورتها على حياته، ولضمان عدم انتشارها

#### رابعاً: الطفيليّات الداخليّة:

##### ١- البيرقوزوا:

الدوستاريا الأمبية، وهو مرض معوى حاد أو مزمن يسبّبه طفيلي «أنتامينا هستيلوتيكا» وهو يصيب الإنسان أيضًا، ويتطفل على الأمعاء الغليظة.

##### الأعراض:

إسهال لفترات طويلة؛ قد تتمدّد عدة أسابيع أو شهور، والبراز يكون مصحوحاً بالمخاط أو مدمماً في بعض الأحيان.

##### العلاج:

- يجب عزل الحيوان المريض وتطهير الأماكن الملوثة، وكذلك التخلص من البراز بطريقة

الترايكوفيتون وفطر إبيدرموفيتون.

##### الأعراض:

ظهور أماكن خالية من الشعر؛ بها قشور على الجلد المصابة وتتحذشكلاً دائرياً.

##### العلاج:

يقص الشعر في المنطقة المحيطة بالإصابة، وينظف المكان بمطهر لإزالة القشور.

يطهر المكان باستخدام مضاد فطري موصى مثل: صبغة اليود وكذلك يمكن استعمال المراهم المضادة للفطريات.

##### الوقاية:

- الكشف الدوري على الحيوانات؛ لاكتشاف المرض في بدايته.

- التطهير الدوري لأدوات الحيوان، وكذلك مساكن الحيوانات.

- عدم استعمال أدوات غير أدوات الحيوان.

##### ٢- التينيما فافوزا:

مرض يصيب الجلد، يكون على هيئة كتلة من الفطر تشبه فوهة الفنجان ويكون لونها أصفر، وتسبّب تساقط الشعر والصلع، وسبّبها فطر التريكوفيتون.

##### الأعراض:

ظهور كتل مستديرة صفراء اللون مغطاة بقشور سميك في أماكن متفرقة بالجسم.

##### العلاج والوقاية:

كما في الرينج وورم.



يظهر على الحيوان إسهال رغوي له رائحة مميزة، وتنقل العدوى عن طريق الفم، غالباً من تواجد الطفيلي في صورة تحوصل بما الشرب (سواء للإنسان أو الكلاب).

#### العلاج:

يعالج بمستحضر ٢٥ مجم/كجم من وزن الحيوان بالفم كل ١٢ ساعة لمدة يومين ويكرر بعد ٥ أيام نظام العلاج مرة أخرى.

#### خامساً: الطفيليات الخارجية:

##### ١- القراد:

يجب مقاومة الطفيلي على الحيوان ثم على الأماكن المحيطة والمسكن، ويقاوم على الحيوان باستخدام طريقة الرش باستخدام ٥٪ مالاثيون أو ٥٪ ليندان أو دلتاميثرين، كما يمكن استخدام طريقة التعفير باستخدام ١٪ ليندان أو ٥٪ بودرة مالاثيون أو بيرترين ٢٥٪، كما يمكن استخدام مستحلب رش في الأماكن والمساكن يحتوى على

البييريميثرين ٤٤ .٠ مجم/كجم من وزن الحيوان.

##### ٥- مرض الجياراتيسيز:

هو مرض يصيب الجهاز الهضمي (الأمعاء) بطفيل الجيارديا الكلبية، وهو طفيلي وحيد الخلية يسبب ضعف الامتصاص للأمعاء ويصيب الإنسان أيضاً. ويتوارد بحظائر الكلاب بنسبة ١٠٠٪ وبنسبة ٥٠٪ في الكلاب.

#### الأعراض:

الذى يقوم بنقل مرض البابيزيا إلى الكلاب.

#### ٣- مرض إليكوس:

تصيب هذه الميكروبات دم الكلاب، وتسبب أعراضًا عديدة منها تضخم الطحال والحمى وأنفحة من الأنف والفم، وتضخم بالغدد الليمفاوية، ويصيب العين والرئتين ويسبب الأنيميا.

#### العلاج:

يتم علاج هذه الميكروبات بمستحضر الدوكسي سيكلين ٥ مجم/كجم ١٢ ساعة بالفم، ومكافحة القراد الحامل للميكروب.

#### ٤- التكسوبلازم:

تصيب الأنسجة العضلية للكلاب كعائل وسيط، وتعالج بمستحضر السلفادياريزيں ٧٣ مجم/كجم من وزن الحيوان بالحقن أو بالفم، مع فيتامين (ب) ومستحضر



- يمكن استخدام الرش بأحد المبيدات الحشرية الآتية:  
الليندان ١٪ أو الكلورдан كل أسبوع حتى تختفي الأعراض).  
وأفضل شيء لعلاج الجرب هو الأميتراز حيث أنه متخصص وآمن جدًا لعلاج جرب الكلاب.

#### ثانياً: الديدان:

١- اسكارس الكلاب (توكسوكارا):  
ديدان أسطوانية كبيرة، تنتقل العدوى عن طريق تناول أطعمة ملوثة بالبويضات؛ فتفقس في الأمعاء وتهاجر عن طريق الدم إلى الرئة، ثم تعود بعد ذلك إلى الأمعاء؛ حيث تتكاثر وتعطى البويضات التي تفرز عن طريق البراز ثم تتطور البويضات ويتحول داخلها الجنين إلى يرقة؛ ثم تنسليخ إلى الطور اليرقى الثانى داخل البويضة وهى الطور المعدى.

#### الأعراض:

هي منتشرة في الأجراء وتنتقل إلى الأجنة من الأم المصابة. وأهم الأعراض وخاصة في عمر الثلاثة أسابيع فأكثر: ضعف النمو، وهزال،

إصابة الجهاز التنفسى، وأعراض تنفسية نتيجة لهجرة اليرقات إلى الرئة، وكذلك إصابات في الكلى وتورمات.

#### العلاج:

إعطاء البرازين، ويمكن إعطاؤه للأجراء عند عمر ثلاثة أسابيع.

**التشخصيص:**  
الأعراض وأخذ عينة من أماكن الإصابة وفحصها تحت المجهر؛ فيرى طفيل الجرب والبويضات.

#### العلاج:

- إزالة الشعر وخاصة في الكلاب ذات الشعر الطويل ورشه كاملاً بالمبيدات الحشرية أو حرقه.  
- عمل حمام بالماء والصابون أو الزيوت المعدين لإزالة القشور للوصول إلى الحفر داخل الجسم ورش الحيوان بمحلول خليط الكبريت والجير؛ باستخدام كالسيوم بولي سلفيد بتركيز ٣٠ - ٣٢٪، ويكرر العلاج كل ٥ أيام حتى تتحسن الحالة.  
- يمكن استخدام مراهם الكبريت وخاصة في الأجراء.



**يجب مقاومة  
الطفيل على  
الحيوان ثم على  
الأماكن المحيطة  
والمسكن**

الدلتاميثرین أو الليندان بتركيز ٥٪ أو الملاطيون ٣٪.  
يجب أن يعاد العلاج مرة أخرى بعد ٢-٣ أسابيع من المعالجة الأولى على الحيوان والأماكن والمسكن.

يجب الرش الدوى للأماكن والمسكن وفحص الحيوان؛ لاكتشاف الطفيل والتخلص منه في بيئته.

#### ٢- البراغيث:

تسبب البراغيث التهابات جلدية وحگًا للجسم وقلقاً للحيوان.

#### العلاج:

يمكن استخدام الأطواق التي تقتل البراغيث في الكلاب وتحتوي على مبيد حشري ينتشر في الشعر وعلى الجلد.  
ويجب رش الأماكن دورياً كما في القراد.

#### ٣- الجرب:

هو مرض معد باللمس والاحتكاك وفي الكلاب أهم الأنواع: ساركوبكت.

#### الأعراض:

الشعور بالهرش وحك الموضع الصاب، ويصبح الجلد جافاً، ويحاول حل جسمه بالأرجل بشدة وعنف، وظهور قشور على الجلد في الأماكن المصابة مع، ازدياد سمك الجلد مكوناً عدة ثنياً، وتمتد الإصابة من الجسم إلى الرأس والوجه والأذن.



#### الأنواع:

- التهاب الجلد الآتوبي؛ وهي إصابة الجلد الموسمية أو غير الموسمية، بحكة واحمرار وقشور وبثور.
- حساسية الجلد بالتلامس، وتظهر احمرار بسيط أو شديد، تساقط الشعر بالأماكن الداخلية والبطنية بجسم الكلب.

#### حساسية الطعام:

وهي لبعض أنواع الأطعمة، وتظهر في صورة احمرار وبثور وقشور، وتساقط الشعر في أماكن مختلفة من الجسم.

#### حساسية الحشرات:

مثل حساسية الجسم من القراد أو القمل أو البراغيث، تنتشر غالباً في الظهر والذيل وبالأماكن الخلفية للجسم.

#### حساسية الأدوية:

والكلب حساسة لكثير من الأدوية وهذا يجب مراعاته من الطبيب المختص وأفضل علاجات الحساسية هو الكورتيزونات الموضعية

العدوى عن طريق الطور الييرقى الثالث الذي يخترق الأغشية المخاطية للفم، وكذلك عند فقس البيض بالستقيم تخترق اليرقات الأغشية المخاطية للأمعاء الطليفة، ثم تهاجر عن طريق الدم إلى الرئتين، ثم تعود بعد ذلك للأمعاء، حتى تصبح ناضجة وتنكاثر.

#### الأعراض:

براز مدم يحتوى على مخاط، إسهال مخاطي، ضعف وهزال وإعاقة في النمو، ولكن شهية الحيوان تستمر دون تغير. في الإصابة الشديدة تؤدي إلى صعوبة التنفس والتهابات رئوية والتهاب معد شديد، وإسهال ومخاط شديد في البراز.

#### العلاج:

إعطاء فينيدازول.

#### الأمراض الجلدية في الكلاب:

##### ١- أمراض الحساسية الجلدية:

الحساسية رد فعل الجسم لمادة ما نتيجة لتكون أجسام مضادة في الدم لهذه المادة، وتتميز بالحكمة والاحمرار.

#### ٢- الديدان الخطافية في الكلاب:

طفيليات أسطوانية يتراوح طولها ما بين ١ - ١,٢ سم، تتغذى على الأمعاء وتسمى ديدان الانكاستوما، وتحدث العدوى نتيجة تناول أطعمة وأشربة ملوثة بالييرقات المعدية، وكذلك تنتقل عن طريق تناول الأجزاء لبن الأم (الحلمات تكون ملوثة بالييرقات المعدية).

#### الأعراض:

من أهمها في الأجراء الأنيميا الحادة وهي غالباً تؤدي إلى النفق.

- الهرزال والضعف وأعراض النقص الغذائي، مع إسهال في بعض الأحيان.

- التهابات في الجلد نتيجة لدخول اليرقات عن طريق الجلد.

#### العلاج:

إعطاء الحيوان مستحضر مينيدازول، ويجب إعطاؤه على معدة خاوية، ويعطى مع مسهل.

#### ٣- ديدان سترونجيلاويدس:

ديدان أسطوانية صغيرة ترى بصعوبة بالعين المجردة، وتنقل