


التهاب المخ والنخاع الشوكي المعدى في الخيول



هو مرض فيروسي يسببه فيروس عصبي ينتقل عن طريق الحشرات؛ حيث يصاب الحيوان باضطراب الوعي والهياج والشلل.

السبب المرضي:

- فلافي فيirus ينتمي إلى مجموعة الفلافي.

وبائيّة المرض:

ينتشر في معظم أنحاء العالم وفي مصر.

طريق انتقال العدوى:

- عن طريق الحشرات مثل الناموس

- القراد - القمل - بعض

الحشرات الماصة للدماء.

- ينتقل المرض من الطيور

إلى الخيول والإنسان

عن طريق الحشرات

الماصة للدماء، ولكن

نادرًا ما ينتقل من

حصان إلى حصان،

وهذا قد يحدث عن

طريق الحشرات

الماصة للدماء.

- نادرًا ما يحدث الانتقال عن

طريق الجهاز التنفسي.

فترقة الحضانة:

١ - ٣ أسابيع.

الأعراض الرئيسية الظاهرية:

- ارتفاع في الحرارة ثم يمر

المرض بثلاث مراحل:

- مرحلة الهياج:

حيث يصبح الحصان

حساساً للصوت، ويسير

الحصان كالأعمى حيث يصطدم

بأشياء أو يمشي في دائرة.

من أعراض المرض
ارتفاع درجة حرارة
الحيوان.. ثم مرحلة
الهياج.. فمرحلة النوم..
فمرحلة الشلل..
فالموت

د. مصطفى فايز

أستاذ الطب البيطري


جامعة قنادة السويس

الحصان العربي وأعلافه الفروسية

يتميز الحصان العربي بالقدرة على المرواغة والالتفاف السريع والدوران؛ ما مكن الفرسان في ميدان الحرب من أداء واجباتهم القتالية، وأيضاً يمكن لمن يمارسون سباقات الفروسية من تحقيق الفوز في السباق.

ولذلك فإن الحواجز لا توضع على خط مستقيم، ومن فروسية الفارس أن يتحكم في فرسه وفي حماسه وحركته.

والحصان العربي أكثر جمالاً ورشاقة من الأجنبي، فهو من حيث الارتفاع أعلى من عند آخر العنق، ومن حيث استقامة الظهر فهو أكثر استقامة، لأن له فقرة ناقصة من العمود الفقري، بينما الحصان الأجنبي مقوس الظهر.



- مرحلة النوم:

وفيها يظهر الحصان كأنه نائم، مع خفض الرأس لأسفل، أو يقف الحصان وأرجله الأمامية معكوسه أو يجلس جلسة الكلب.

- مرحلة الشلل:

- تردد ودوران وشلل في الوجه، ويصبح الحصان غير قادر على رفع رأسه وبالتالي يحدث تدل للأذن والشفة السفلى؛ حيث تصبح مثل بندول الساعة، ويحدث تدل للسان وشلل البلعوم مما يؤدي إلى ضعف في التبرز والتبول ثم شلل كلٍ ويموت خلال 4 أيام.

- في بعض الحالات يشفى الحيوان، لكن يصبح غير قادر على الاستجابة للمؤشرات الخارجية.

الصفات التشريحية:

غير واضحة ولكن يوجد تضخم في الطحال واصفرار الجثة والتهاب المخ.

التشخيص:

- الأعراض المرضية الظاهرية.

- عزل الفيروس.

- الاختبارات السيرولوجيّة.

السيطرة والتحكم في المرض:

- استخدام تحصين ثانوي أو ثلاثي يحضر من الثلاثة أنواع: الشرقي والغربي والفنزويلي.

- في مصر يستخدم التحصين الحي من عترة الفلامي.

- مقاومة الحشرات الماصة للدماء.