

- حول النسر عند زيادة نموها عن الطبيعي.
- ٦- يجب ترك حوالى ٧٥ مم (ربع بوصة) في الطبقة القرنية لتركيب الحدوة؛ بحيث تكون الحافة الخارجية للجدار مائلة بقدر نصف العرض.
- ٧- تنظيف أخمص القدم ومنطقة النسر بعناية وبدون مبالغة، ويكرر ذلك عدة مرات وعلى فترات متقاربة.
- ٨- يجب ترك النسر بدون قص وتقليل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولا ضرورة للتقليل خارج جدار الحافر إلا في الحالات الضرورية.
- ٩- يعمل زيت الحافر على منع الهشاشة في الحوافر ذات الألوان الخفيفة، ويجب فحص وتنظيف الحوافر مرتين كل يوم عند أول سوس (تجهيز الحيوان للعمل أو التدريب) وعند الرجوع من العمل، ويجب أن يوضع زيت الحوافر بالفرشاة لا يعطي منظراً للحافر فحسب، بل لأن ذلك مفيد للحافر، ويجب أن يصل الزيت إلى المادة القرنية في الحافر وفي الداخل.

د. مصطفى فايز
أستاذ الطب البيطري
جامعة قنادة السويس

- الهدف من تقليل حوافر الخيل هو منع صدمات الأرض بالقدم؛ حيث إن زيادة احتكاك الطبقة القرنية للحافر بالأرض قد يؤدي إلى:
- اضطراب التوازن الأمامي الخلفي للأرجل.
 - ضعف الدورة الدموية حول القوائم.
 - رضوض وعرج لزيادة الضغط على الأجزاء الحساسة فوق الطبقة القرنية بالحافر.
- التقليل:**
- ١- يمكن تقليل حوافر الخيول الصغيرة كل أسبوع أو أسبوعين (للتعميد على ذلك) مع استخدام أقل عدد ممكن من ضربات المقص، على أن تجرى التدريبات على أرض صلبة.
 - ٢- يتم تقليل الأظافر على فترات متقاربة ومنتظمة، وخاصة عند المعيشة داخل الحظائر لفترة طويلة.
 - ٣- تقليل معظم الخيول وترك لها حدوة كل ٤ - ٦ أسابيع عند اللزوم.
 - ٤- يجب تقليل الأظافر في خط مستقيم؛ لضمان الاحتفاظ بشكلها بحيث يكون للساقي نفس زاوية ميل الرسخ
 - ٤٥ - ٥٠ على سطح الأرض، مع المحافظة على استدارة القدم، واستخدام الصمامات عند اللزوم.
 - ٥- يجب تقليل الرقائق الصلبة

