


من السهل السيطرة على مرض الحمى القلاعية؛ إذا نفذت الإجراءات الوقائية بدقة وحزم، خصوصاً في الأقطار والمناطق التي ينتشر بها المرض.

ومن سبل التحكم في المرض ما يلي:

١- في الأقطار الخالية من المرض يتم السيطرة على استيراد الحيوانات الحية من المناطق التي بها المرض والمنتجات الحيوانية، ووضع الحيوانات في الحجر البيطري مدة كافية وفحصها، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحالات الإيجابية.

٢- في الأقطار التي بها المرض تعتمد السيطرة على المرض أساساً على:

- التحصين باللقاح الميت جرعتين الفرق بينهما شهر، ويعاد التحصين كل ٤ أشهر أو طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة، ويكون التحصين للنوع المتواجد داخل البلد فقط وليس لكل العترات.
- العجول الرضيعة من أمهات محصنة يتم تحصينها من ٤ - ٦ أشهر، لكن العجول من أمهات غير محصنة يتم تحصينها فور ولادتها.
- اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية المناسبة للمزارع المصابة، وتحديد أماكن الحيوانات المصابة وعدم نقلها بين المحافظات أثناء انتشار المرض.
- تنظيف الحظائر وتطهيرها بمادة كاوية مثل البوتاسا أو الصودا الكاوية بنسبة ٢- ٥٪.
- عمل أحواض بمداخل المزارع تحتوى على مواد مطهرة لمرور السيارات والعمال؛ لعدم نقل العدوى من أو إلى المزرعة.
- التخلص من الذباب والحشرات التي لها دور في نقل العدوى بتلويث العلائق ومصادر المياه. وذلك بوضع أسلاك ضيقة الفتحات على النوافذ والأبواب.
- بالنسبة للحوم: تعمد الذبيحة كاملة في حالة ما إذا كانت محمومة، أما في حالة عدم ارتفاع الحرارة تعمد أماكن الإصابات فقط.
- بالنسبة للألبان: يراعى غليها جيداً لمدة كافية، والفيروس يتأثر بالحرارة المباشرة بسرعة؛ حيث يتم القضاء عليه نهائياً.



سبل السيطرة

والتحكم

في مرض الحمى

القلاعية



د. مصطفى فايز

كلية الطب البيطري

جامعة قناة السويس