

يعتبر السمان طائرًا اقتصاديًا لارتفاع البيض واللحوم إلى جانب الدجاج، حيث إنه طائر صغير نسبياً ويتأقلم بسهولة مع التربية المكثفة، وهو طائر سريع النمو والنضج الجنسي، كما يتميز بمعدل عالٍ لإنتاج البيض والمقاومة العالية للأمراض، فلا يحتاج إلى التحصينات الدورية للدجاج. لذلك فمن المتوقع أن يزداد انتشار مزارع السمأن في السنوات المقبلة وتصبح بديلاً قوياً لمزارع الدجاج.

من المتوقع انتشار مزارعه خلال السنوات المقبلة

# البيئة المثالية للتربية السمأن

٤- مقاومة السمأن للأمراض عالية نسبياً بالمقارنة بأنواع الدجاج الأخرى.

٥- المساحة المطلوبة للتربية صغيرة نسبياً (٨٠ - ١٠٠ طائر/م).

وفي الوقت نفسه إذا كان المشروع لإنتاج البيض فنلاحظ أن إنتاج البيض عالٍ جداً فهو ٣٠٠ بيضة لكل طائر في السنة. وإذا كان المشروع للتربية فنلاحظ أن



د. مصطفى فايز

بقلم:

## مميزات طائر السمأن:

- ١- مدة التسمين قصيرة نسبياً (٣٦ يوماً تقريباً).
- ٢- تستهلك السماء (٥٠٠ - ٦٠٠ جم على فل خلال مدة التربية (٣٦ يوماً) حيث يصل وزن السماء إلى ٢٠٠ جم في المتوسط أي بمعدل تحويل ٢.٧٪.
- ٣- يتميز لحم السمأن بجودة الطعم وقلة الكوليسترول.

## **□ يرتبط وزن السمان ارتباطاً وثيقاً بتركيبة العلف ويتم تسويقه عند عمر ٣٧ يوماً حيث يكون متوسط الوزن ١٩٠ جم تقريباً**

يتوقف تقليل البيض، وتكون درجة حرارة المفكس  $2^{\circ}\text{C}$  (٩٩٪) والرطوبة النسبية ٧٠٪.

### **التحضين:**

تحضن كتاكيت السمان عند ٤٦ يوم وتقلل درجة الحرارة درجتين أسبوعياً حتى عمر ٢٨ يوماً. مع مراعاة رفع درجة الحرارة درجتين عن معدلها في حالة ظهور أي أعراض مرضية.


- يجب توخي الحررص فى الأسبوع الأول من العمر حتى لا تفرق الكتاكيت فى سقایات المياه (يمكن وضع بعض الحصى لمنع الكتاكيت من النزول فى المياه).

- توضع فرشة عميقة ١٠ سم من نشاره الخشب فى التربية الأرضية، وينثر العلف فوق ورق الجرائد أو شكائر العلف الفارغة خلال الأسبوع الأول من العمر.

- يفضل إضافة فيتامين  $A\&D_3$  هـ فى مياه الشرب فى اليوم الأول، ثم يضاف مضاد حيوى مناسب لمدة ٤ أيام، وبعد ذلك لمدة يومين مرة أخرى.

### **التسويق:**

- يسوق السمان عند عمر ٣٧ يوماً، ويكون متوسط الوزن ١٩٠ جم تقريباً، وبطبيعة الحال فإن وزن السمان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتركيبة العلف.



## **□ السمان هو الطائر الوحيد الذي يعطي بيضًا عند عمر ٤٥ يومًا فقط**

الخصوصية كما تتزايد نسبة التشوهات بعد هذا العمر.

### **التغذية:**

- تستخدم المفرخات الخاصة بالدجاج بعد تعديل أدراج وضع البيض لتتناسب مع حجم بيض السمان، ويفقس البيض بعد ١٧ يوماً.

- تضبط درجة حرارة المفكس عند  $37.5 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$  (٩٩.٥٪ ف) والرطوبة النسبية ٦٠٪ حتى اليوم ١٤، وخلال هذه الفترة يتم تقليل البيض كل ٤-٢ ساعات، ثم ينقل البيض إلى أدراج الفقس حيث

السمان هو الطائر الوحيد الذى يعطى بيضًا عند عمر ٤٥ يومًا فقط، وفترة حضانة البيض قصيرة جداً فهى ١٧ يومًا فقط.

### **الطريقة المثلثة للتربية قطيع أمهات السمان**

تفضل تربية الأمهات فى بطاريات مخصصة للسمان ويوضع فيها السمان بنسبة ذكر واحد لكل ثلاثة إناث. ويكون متوسط الوزن عند عمر ٦٠ يوماً للذكر ٢٥٠ جراماً وللأنثى ٣٠٠ جرام تقريباً، ولا يتم جمع البيض للتفرير قبل عمر ٦٠ يوماً.

### **البيئة المثالية للتربية:**

فى بطارية الأمهات يكون عدد ساعات الإضاءة ١٨-١٧ ساعة يومياً (لا يفضل ضوء الشمس المباشر)، كما يجب أن تكون أرضية العنبر خرسانية وتهويته جيدة.

### **جمع بيض الأمهات:**

يجمع البيض مرتين يومياً على الأقل ويراعى النقاط التالية:

- ١- يستبعد البيض الصغير والكبير، ولا يستخدم سوى البيض متوسط الحجم.
- ٢- يحفظ البيض فى مكان بارد (٩٤ م تقريباً).
- ٣- لا تزيد فترة حفظ البيض على أسبوع.

- ٤- تجب معاملة البيض بحرص شديد؛ لأن القشرة الخارجية لبيض السمان رقيقة نسبياً.
- ٥- يُتصح بعدم تربية الأمهات بعد عمر ٦ شهور؛ حيث تقل نسبة