

قواعد تكوين القطع و اختيار أفراد التربية في الأرانب



د. مصطفى فايز

٤ أشهر. في هذا الوقت من السنة يتوافر الإنتاج لدى المربين ويكون شمنه منخفضاً.

- ثانياً: أن يقوم المربى بشراء الأعداد المطلوب تربيتها قبل بدء موسم الولادة الذي يبدأ منذ نهاية أكتوبر إلى مايو من كل عام. ففي هذا الوقت يتوافر البرسيم الذي يعتبر الغذاء

- ثالثاً: اختيار السلالة سريعة النمو.

كيف نبدأ؟

هناك طريقتان للبدء في إنشاء المزرعة نذكرهما فيما يلى:

- أولاً: أن يقوم المربى بشراء العدد اللازم له من الإناث والذكور صغيرة السن في موسم الشتاء، على أن يتراوح عمرها ما بين ٣-

ينبغي عند اختيار أنواع الأرانب أن يراعى ما يأتى:

- أولاً: بدء التربية بنوع واحد حتى يركز المنتج عنايته فيه.

- ثانياً: دراسة أحوال السوق المحلية وهل يستطيع المنتج تصريف الأنواع الكبيرة أم المتوسطة أم الصغيرة، وهل يستطيع تصريف اللحم أم الفراء أم كليهما؟.



٣- أن لا يكون الأرنب كبير السن، ويعرف كبير السن بالعينين وتقوس الظهر.

٤- أن يكون سليمًا من الأمراض ويمكن معرفة بعضها بما يلى: إن وجد بالأذن قشر من الداخل دل ذلك على إصابته بمرض تصمغ الأذن.

إن وجد قشر في مقدمة الأنف أو أعلى الجلد بين الأظافر دل ذلك على مرض الأرنب بالقراع أو الجرب.

وإن وجد رشح على فتحات الأنف دل ذلك على إصابته بالزكام والتزلات الشعبية.

وإن كان براز الأرنب سائلاً، دل ذلك على إصابته بالإسهال، وإن


المناسب للكبار والصغار من الأرانب.

كيف نشتري؟

وبعد أن نحدد نوع الأرنب الذي سنربيه، علينا أن نشتري العدد المناسب منه. ويشترط عند انتقاءها وشرائها مراعاة النقاط الآتية:

١- يفضل أن يتم الشراء مباشرةً من المزرعة؛ كى ترى بنفسك مستوى المزرعة وبالتالي تحدد مبدئياً درجة النظافة والرعاية الصحية التي عليها القطيع المزمع شراؤه.

٢- أن يكون الأرنب نشطاً، مفتوح العينين -لهمما بريق- ذا شعر ناعم أملس متماسك في جلده.



**يفضل أن يتم شراء
الأرانب من المزرعة
مباشرةً؛ كى يرى
المربى الحالة التي
عليها القطيع،
ومستوى النظافة
والرعاية اللتين
يتمتع بهما**

- احمرار في الجفون أو تقيح في الفراء حول العين.
- ٤- أن تكون أذن الأرانب نظيفة خالية من مرض تصمغ الأذن أو الالتهابات أو القشور.
- ٥- أن تكون أنف الأرنب نظيفة لا يخرج منها إفرازات سواء سائلة (مصاب بالبرد) أو لزج (مصاب بزكام).
- ٦- أن تكون أسنان الأرنب سليمة لا يوجد بها كسور أو تشوهات مثل بروز أسنان الفك العلوي أو السفلية بخروجها من الفم أو انغراسها في أنسجة الفك الآخر.
- ٧- أن تكون أرجل الأرنب سليمة خالية من الكسور والالتهابات التي تعيق الحركة الطبيعية للأرنب (مثل الشلل أو الكساح)، وخلالية من التهاب العرقوب بالأرجل الخلفية، وخالية من مرض الجرب.
- ٨- أن تكون فتحة الشرج طبيعية غير ملتتصق بها ذبل (عدم الإصابة بالإسهال أو الكوكسيديا).
- ٩- أن تكون البطن طبيعية وغير منتفخة.
- ١٠- أن تكون حلمات الصدر في الإناث سليمة، ولا تقل عن ٨ حلمات.
- ١١- يجب أن تزن الأرانب نحو ٢-١,٥ كيلو جرام عند بلوغها عمر ٤-٣ أشهر عند الشراء.
- ١٢- أن تكون الذكور بعيدة القرابة



يجب عزل الأرانب المشتراء قبل إدخالها المزرعة أو المنزل لمدة عشرة أيام على الأقل، للتأكد من خلوها من مرض الكوكسيديا.


كان جافاً دل على إصابته بالإمساك.

٥- يجب عزل الأرانب المشتراء قبل إدخالها المزرعة أو المنزل لمدة عشرة أيام على الأقل، للتأكد من خلوها من الأمراض، وفي أثناء هذه المدة يحسن الكشف على برازها للتأكد من خلوها من مرض الكوكسيديا.

فحص الأرانب عند الشراء:

عند شراء الأرانب يجب التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض ويجب فحص الأرنب مظاهرياً ومراعاة الآتي:

- ١- أن يكون الأرنب ذات نشاط وحيوية عالية ومظهره لا يدل على الضعف والمهزال (حركته طبيعية- لا يتحرك بخمول وبطيء).
- ٢- أن يكون فراء الأرنب نظيفاً ذات لمعة، متGANس على الجسم كله، لا يوجد به تقيحات.
- ٣- أن تكون عيون الأرانب لامعة لا يوجد بها التهابات أو دموع أو





في الصباح الباكر، أما في الشتاء فيتم النقل وقت الظهيرة.

■ يراعي عدم تكدس الأرانب في أثناء النقل، والأفضلية هنا فصل كل عدة أرانب على حدة في مقاطف خوصية أو أقفاص بلاستيكية أو سلكية مزودة بغطاء لغلاقها، مع مراعاة أن تسمح تلك الأقفاص بدخول الهواء المتجدد أثناء رحلة النقل.

■ عند الوصول يجب أن تكون في أشد الحذر لتجنب إزعاج الأرانب وإلا ستعرضهم دون شك للمرض أو الموت. لذا انقلهم وأمسكهم بمنتهى الهدوء واللطف.

■ كما يُراعي عند الوصول أن تقوم بإinzال الأقفاص من فوق سيارات النقل بمنتهى الهدوء



النجاح في اختيار أمهات التربية، يعد من أهم عوامل نجاح مشاريع تربية الأرانب، إضافة إلى حسن الرعاية والغذية المتنزة

■ بالنسبة لوقت النقل، فالمحدد هنا هو درجة الحرارة، فلو كان الجو حاراً يُفضل أن يتم النقل

عن الإناث؛ وذلك للبعد عن تزاوج الأقارب.

هذا ويجب أن نؤكد أن شراء الأرانب لا بد أن يتم من مصادر موثوقة بها وبناءً على السجلات، مع الاستعانة بنوى الخبرة المعهود فيهم الأمانة عند الشراء.

كيفية نقل الأرانب إلى مزرعتك:

عملية النقل عملية حساسة جدًا، نظرًا للطبيعة الحساسة للأرنب، لذا يجب اتباع النقاط التالية لتمر العملية إلى بر الأمان:

■ لا تعطى أي غذاء قبل النقل، فلا ينصح بنقل الأرانب ومعدتها ممتلئة. ولو كانت رحلة النقل طويلة يُكتفى بإعطاء غذاء من فترة إلى أخرى.



٤- أن تكون الأم خالية من الأمراض والتشوهات.

٥- أن تكون للأئذى من ١٠-٨ حلمات ظاهرة كاملة التكوين.

مدة استغلال (استخدام)

الأمهات في التربية:

يفضل من الناحية الاقتصادية أن يتم استغلال الأمهات لموسم إنتاج واحد، ويمكن للمربي إذا وجد أن إنتاجية القطيع في الموسم الواحد مرتفعة ونسبة الخصوبة عالية أن يحتفظ بأفضل الإناث للموسم الإنتاجي التالي بحيث لا يتعدى نسبة الـ ٧٠٪ من القطيع. ولا يوصى اقتصادياً بتربية قطعان الأمهات بعد ذلك إلا في حالة تربية السلالات النادرة أو إذا كان هناك برنامج تربية خاص. وجدير بالذكر أن الأمهات قد تستمرة في الإنتاج لمدة خمس سنوات في أحوال خاصة ونموذجية من الرعاية والتغذية.



بجوار مساكنهم (العنابر) حتى يتتسنى للأرانب أخذ فترة من الراحة والهدوء، وفي أثناء تلك الفترة تقوم أنت بتجهيز عنابرهم (وضع الماء والغذاء).

تكوين قطيع الأرانب:

عند بداية المشروع يفضل للمربي خاصة إذا كان مبتدئاً شراء أعداد قليلة من الأرانب عند عمر من ٣-٢ أشهر، في مارس أو أبريل وتظل بالمرزعة تحت رعاية المربي حتى تتأقلم على المسكن التي تربى فيها إلى أن تصل إلى عمر النضج الجنسي في سبتمبر تقريباً حيث يبدأ برنامج الإنتاج بالمرزعة.

اختيار إناث (أمهات) التربية:

إن من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح مشاريع الأرانب هي الاهتمام باختيار أمهات التربية ثم الرعاية والتغذية المترنة،

نقل الأرانب إلى المزرعة أو المنزل، عملية غاية في الحساسية؛ لذا يجب الالتزام بتعليمات النقل لتتم العملية بنجاح

ويجب أن يراعى الآتى عند اختيار الأمهات:

١- أن تكون الأم هادئة الطياع غير سمينة.

٢- استطالة الجسم، وأن تكون عظام الحوض عريضة.

٣- يجب أن يكون الشكل الخارجي مطابقاً للمواصفات المظهرية الخاصة بالسلالة.



التربية الداخلية، وما يترتب عليها من أضرار تلحق بالإنتاج.

الأمهات التي يجري لها إحلال:

- ١- الأمهات النافقة.
- ٢- انخفاض إنتاجية الأم بسبب انخفاض الخصوبة أو تكرار ولادة أعداد قليلة من الصغار.
- ٣- الإصابة المرضية المتكررة مثل التهاب العرقوب- الالتهاب الرئوي- التهاب الضرع- التهاب الرحم- الجرب.
- ٤- احتباس الأجنحة أو تحوصلها ما يؤدي إلى إصابة الأم بالعمق.
- ٥- عدم تطور الغدد اللببية وإنما اللبن.
- ٦- تكرار افتراض الخلفة أو إهمالها وعدم القيام بارضاعها.
- ٧- إصابة الأم بتتشوه الأسنان حيث أنه مرض وراثي.
- ٨- تكرار الولادة خارج صندوق الولادة.
- ٩- انتهاء الحياة الإنتاجية للأم (ولادة عشر بطون أو وصول الأم إلى عمر سنتين).

- الإصابة بالأمراض مثل (الإصابة بالجرب، الالتهاب الرئوي الشديد، التهاب الرحم، التهاب الضرع، التهاب أو تقرح العرقوب الشديد، الإصابة بالشلل أو الأسنان الطويلة).

- انخفاض الخصوبة أو حدوث عقم أو الإناث لا تقوم برضاعة صغارها أو تقوم بافتراس الخلفة أو هجر العش وترك الخلفة.

وتنتمي تلك العملية بأن يقوم المربى بالاحتفاظ بعده من الإناث أو الذكور في أعمار متدرجة حتى يمكن استبدال أي أربن في القطيع الأساسي في أي وقت للأسباب السابقة، وبالتالي ضمان الإنتاج المنتظم طوال الموسم. وينصح المربى في حالة التربية بأعداد قليلة بحجز قطيع الإحلال من إنتاجه وخاصة الإناث ويقوم بشراء الذكور أو يقوم باستبدالها مع مربين آخرين حتى يتفادى عملية

اختيار ذكور التلقيح:

ختار الذكور عادة من عمر أكبر من الإناث بشهر حتى تستطيع أن تقوم بدورها في عملية التلقيح والإخصاب بكفاءة. ويخصص ذكر واحد لكل ٨-٦ إناث، ويجب مراعاة عدم استخدام الذكر لأكثر من مرة واحدة يومياً أو مرتين عند الضرورة أو ٣ مرات أسبوعياً.

مدة استغلال الذكر:

لا ينصح اقتصادياً بتربية الذكر لأكثر من موسم واحد؛ نظراً لأن قدرتها الجنسية تقل بتقدم العمر. لكن يمكن الاحتفاظ بالذكر لموسم إنتاجي آخر إذا توافرت لديه الحيوية والكتلة التناسلية العالية.

الإحلال في قطيع الأرانب:

الإحلال عملية مقصود بها الحفاظ على حجم القطيع ثابتاً باستمرار في حالة تعرض أي أربن بالقطيع الأساسي للنفوق أو الاستبعاد بسبب: